



Bulletin de Santé du Végétal

HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE

N°16 – 22 octobre 2026



Retrouvez gratuitement le
BSV HORTICULTURE ET
PEPINIERE sur le site de
[FREDON Normandie](https://www.fredon-normandie.fr)



Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site de [DRAAF Normandie](https://www.draaf-normandie.fr)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OBSERVATIONS PONCTUELLES ET DES RELEVES DE PIEGEAGES REALISES DEPUIS 15 JOURS

	Production				Distribution / Vente	
	Pépinière		Horticulture		Produits finis	
Secteur géographique	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76
Nb d'observations	6	/	2	4	/	/
1 observation = 1 établissement à une date donnée						
Suivi piégeages						
<i>Duponchelia fovealis</i>			6	6		
<i>Lygus rugulipennis</i>			3	3		
<i>Palpita vitrealis</i>	4	1				
nombre d'établissements participants aux dispositifs de piégeage						

POINT METEOROLOGIQUE

Le basculement vers l'automne est brutal après une première quinzaine d'octobre anormalement sèche et douce. Résultat, certains ravageurs comme les aleurodes peuvent être problématiques ponctuellement et localement. Au niveau maladie, la rouille continue à s'exprimer. Les cumuls de précipitations enregistrés sont les bienvenus pour les sols et en vue des arrachages en pleine terre. La tempête Austen arrive sur la Normandie. Nous rentrons en vigilance orange.

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations issues d'un réseau d'observateurs. La fiabilité du BSV est d'autant plus grande que le nombre d'observations est important.

Rejoignez le réseau et participez à l'enrichissement des BSV en apprenant à mieux observer vos cultures ou vos plantes finies !

Inscrivez-vous auprès de l'animateur :
damien.loisel@fredon-normandie.fr

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



SOMMAIRE

Horticulture.....	2
Les ravageurs.....	2
Aleurodes.....	2
Cochenilles.....	2
Pucerons.....	3
Thrips.....	3
Les maladies.....	3
Oïdium.....	3
Ramularia.....	4
Suivi piegeages.....	4
Pépinière.....	6
ORNEMENTALE.....	6
Les ravageurs.....	6
Chrysomèles/Galéruques.....	6
Chenilles.....	6
Cicadelles.....	6
Cochenilles.....	7
Otiorhynques.....	7
Pucerons.....	7
Punaises.....	8
Tenthrèdes.....	8
Thrips.....	9
Les maladies.....	9
Oïdium.....	9
Phytophthora.....	9
Rouille.....	10
Symptômes de galles de type <i>Agrobacterium</i>	10
AUXILIAIRES.....	12
BASE ABAA Auxiliaires.....	12
LIENS UTILES.....	12
NOTES BIODIVERSITE.....	13
Les notes nationales biodiversité.....	13
FOCUS FULGORE TACHETE OQ ET PREMIERE DETECTION EN EUROPE.....	14



Les ravageurs

Aleurodes

2 établissements concernés



À l'extérieur et sous abris, des vols d'adultes et quelques pupariums ont été observés sur l'ensemble des chrysanthèmes dans un établissement qui pratique également le maraîchage en parallèle. Une pression de fin de saison qui s'explique notamment par la douceur de début octobre. Il s'agit de *Trialeurodes vaporariorum*.

Dans un autre établissement, une faible attaque a été constatée sur l'ensemble des choux d'ornement. Il s'agit d'*Aleyrodes proletella*.

Pupariums de *Trialeurodes vaporariorum* sur chrysanthème



Les aleurodes peuvent être vecteurs de virus. Attention aux adventices dans les serres qui sont des plantes relais et maintiennent les populations en place.

Filière Horticulture



Poinsettia : itinéraire innovant grâce à des plantes-pièges

[https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-](https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Fiche%20Syst%C3%A8me%20HORTIPOT_Astredhor%20Pays%20de%20Loire_Poinsettia.pdf)

[10/Fiche%20Syst%C3%A8me%20HORTIPOT_Astredhor%20Pays%20de%20Loire_Poinsettia.pdf](https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Fiche%20Syst%C3%A8me%20HORTIPOT_Astredhor%20Pays%20de%20Loire_Poinsettia.pdf)



À surveiller !

Evolution à suivre : les aleurodes sont présents toute l'année sous serre. La durée du cycle est d'environ 20 jours à 27°C. Le piégeage des adultes sur des panneaux jaunes englués permet de détecter leur présence.

Méthode de lutte et prophylaxie :

- ↳ Désherbez les serres, les abris et leurs abords.
- ↳ Évitez de garder des stocks de plantes dans un coin de serre qui sont des refuges pour les aleurodes.
- ↳ Examinez attentivement les plants avant leur entrée en culture sous serre.
- ↳ Soyez vigilant à la mise en place de nouvelles cultures qui font suite à une culture ayant été propice aux aleurodes ou sur des cultures dites sensibles (ex : Poinsettia).



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Cochenilles

3 établissements concernés

Une attaque de cochenilles farineuses a été observée sur un vieux lot d'agapanthes. Dans un second établissement, une attaque de cochenilles à bouclier a été observée sur *Furcraea parmentieri*.

Des cochenilles des racines ont également été constatées dans un dernier établissement sur *Aloe sp.*



À surveiller !

Evolution à suivre : les cochenilles sont souvent très polyphages. Veillez à ne pas contaminer de nouvelles cultures/introductions. Il convient parfois de jeter les vieux stocks ou les fins de culture. Un vide sanitaire doit être envisagé quand celui-ci est possible.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller

Pucerons

2 établissements concernés

Sous abris, de faibles attaques sont relevées sur chrysanthème pomponette, myosotis et hortensia. Dans cette dernière culture, de nombreuses larves de cécidomyies prédatrices (*Aphidoletes sp.*) ont été observées en nombre.



À surveiller !

Evolution à suivre : surveillez vos cultures et plus particulièrement sous abris, les conditions sont favorables à leur développement. Observez également la présence de la faune auxiliaire.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Thrips

2 établissements concernés

Sous serre, la présence de thrips a été relevée sur chrysanthème pomponette dans 2 établissements suite à des frappages sans symptômes. Dans un établissement, des symptômes de piqûres du feuillage sont observés sur lupin et giroflée.



Adulte de thrips
(Taille réelle 0,8mm à 1,2mm)



Larve de thrips
(Taille réelle 0,6mm à 0,8mm)



À surveiller !

Evolution à suivre : à surveiller toute l'année sous abris. La température est le facteur essentiel jouant sur le développement des thrips : plus la température est élevée, plus le cycle est rapide.

Les maladies

Oïdium

3 établissements concernés



Oïdium sur ancolie

Sous serre, de faibles attaques ont été observées sur hortensia et ancolie. Une forte attaque a été constatée dans un établissement sur *Brunnera macrophylla* et dans un autre sur *Viola cornuta*.



À surveiller !

Evolution à suivre : l'oïdium prolifère à la faveur de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et de l'humidité. Distancez suffisamment les plants. Aérez au maximum vos abris et évitez de mouiller le feuillage lors des arrosages notamment en fin de journée. Le choix variétal est à prendre en considération.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Ramularia

1 établissement concerné

Sous abris, quelques cas de *Ramularia* ont été observés sur pensées. Cette maladie foliaire provoque des taches grises brunâtres bordées d'un liseré brun foncé avec au centre des ponctuations blanches.



Ramularia sur pensée

Méthode de lutte et prophylaxie :

- ↳ Distancez suffisamment les plants.
- ↳ Aérez au maximum vos abris.
- ↳ Évitez les excès d'humidité.



À surveiller !

Evolution à suivre : à surveiller. Les conditions météo sont de plus en plus favorables à son développement. L'humidité favorise le développement de ce champignon. Les conditions optimales de développement sont à des températures de 15°C et une humidité relative >95%.

SUIVI PIEGEAGES


3 dispositifs de piégeages ont été installés semaine 18.

Duponchelia fovealis



Depuis 2011, un piégeage est réalisé tous les ans pour suivre les populations de *Duponchelia fovealis* en priorité sur le cyclamen. 12 horticulteurs participent à ce dispositif BSV.

13 nouvelles captures ont été enregistrées pour ce 12ème relevé. 3 ETS ont piégé. L'ETS 4HN, qui a piégé le plus depuis la campagne, enregistre encore un relevé conséquent avec 7 papillons même si la pression redescend. Enfin, les ETS 4BN et 6BN enregistrent respectivement 1 et 5 papillons piégés.




Lygus rugulipennis



Depuis 2024, un piégeage de la punaise *Lygus rugulipennis* est réalisé à proximité de chrysanthème. 6 horticulteurs participent à ce dispositif BSV.

Aucune capture dans le réseau pour ce 12ème relevé.



Palpita vitrealis



Nouveauté cette année, un piégeage de la Pyrale du jasmin, *Palpita vitrealis*, est réalisé sur olivier (5 pièges) et troène (1 piège). 5 pépiniéristes revendeurs participent à ce dispositif.

Aucune Pyrale du jasmin n'a été piégée lors de ce 12ème relevé ni depuis le début du dispositif.



ORNEMENTALE

Les ravageurs

Chrysomèles/Galéruques

1 établissement concerné

Adulte et larve de *Melasoma populi* sur saule

La présence de la chrysomèle du peuplier, *Melasoma populi* (quelques adultes et larves) a été observée sur peupliers et saules. Les dégâts sont faibles.

**Fin de risque**

Evolution à suivre : dernière génération en cours, les adultes vont hiverner dans la litière et s'accoupleront à la sortie du printemps sur peuplier et saule notamment.

Chenilles

2 établissements concernés

A l'extérieur, quelques faibles attaques de chenilles ont été observées :

- *Acronicta psi*
- *Acronicta rumicis*
- *Zeuzera pyrina* sur *Photinia x fraseri*

Jeune chenille de
Zeuzera pyrina et galerie sur
Photinia x fraseri

**À surveiller !**

Evolution à suivre : les *Acronicta* sont rarement dommageables. Pour *Zeuzera pyrina*, le plus efficace en cas de forte attaque repose sur une lutte mécanique en coupant les jeunes pousses atteintes et en les jetant dans un sac aux ordures ménagères pour incinération. Attention, ce ravageur pourrait être en recrudescence suite à la chaleur et à la sécheresse enregistrée cette année.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Cicadelles

2 établissements concernés

Sous abris, des présences faibles à modérées de cicadelles vertes ont été observées dans des cultures de *Ceanothus sp.*, de rosier et de menthe.

**À surveiller !**

Evolution à suivre : les pullulations sont favorisées par les épisodes chauds. Les cicadelles sont désormais considérées comme des ravageurs émergents sur de nombreux arbustes et plus principalement des persistants.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Cochenilles

3 établissements concernés



Nymph de *Coccus hesperidum*
à la loupe binoculaire

Sous abri, de fortes attaques de la cochenille polyphage, *Icerya purchasi*, ont été observées sur *Acacia dealbata* et *Acacia retinoides* dans un premier établissement. Dans un second, des jeunes nymphes d'une autre cochenille polyphage, *Coccus hesperidum* ont été observées sur des arbres d'ornement et arbustes d'ornement et plus particulièrement les *Cercis*. Dans le troisième établissement, des cochenilles farineuses ont été observées sur *Vitis*.



À surveiller !

Evolution à suivre : ces cochenilles se propagent aux premiers stades larvaires ou par le vent.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Otiorhynques

1 établissement concerné

A l'extérieur, une attaque d'otiorhynque sur des cultures de *Photinia* a été signalée.



Larve d'otiorhynque


Filière Horticulture



Consultez l'itinéraire innovant pour les cultures sensibles à l'otiorhynque (Fiche DEPHY):

https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_dephy_otiorhynque_cle82d9c3.pdf

Cycle de vie d'*Otiorhynchus sulcatus*



À surveiller !

Evolution à suivre : surveillez le système racinaire à la recherche de larves dans vos plantes en conteneurs. Les larves sont actives jusqu'à fin novembre-début décembre.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Pucerons

6 établissements concernés



Nymphes de coccinelles en nombre sur *Euonymus europaeus*

A l'extérieur, sur des cultures de jeunes plants, des fortes attaques ont été constatées sur *Photinia x fraseri* et *Euonymus europaeus*. Sur cette dernière culture, il s'agit d'*Aphis fabae*. En automne, les formes sexuées d'*Aphis fabae* s'accouplent et déposent des œufs d'hiver foncés sur l'écorce, les rameaux et les aisselles des bourgeons de cet hôte. Dans les foyers, de fortes

présences de coccinelles (larves, nymphes et adultes) ont été observées. Les foyers sont en cours de maîtrise.

Sous abris, de fortes attaques sont constatées :

- *Sarucallis kahawaluokalani* sur *Lagestroemia* avec fumagine ;
- *Illinoia liriodendri* sur *Liriodendron tulipifera* (avec défoliation précoce) ;
- *Lachnus* sp. sur *Quercus palustris* et *Salix* spp., autre gros puceron sur *Acer* sp..



À surveiller !

Evolution à suivre : surveillez les cultures, les conditions météo restent favorables à leur développement. Observez également la présence de la faune auxiliaire.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Punaïses

2 établissements concernés



L'automne est là et les punaises sont de plus en plus visibles dans les cultures ornementales et vont bientôt chercher à s'abriter pour l'hiver. De nombreuses punaises ont été vues, principalement des adultes de *Dolychoris baccarum* et *Leptoglossus occidentalis*. Enfin, des larves de *Nezara* sp. ont également été constatées.

Punaïse américaine du pin
Leptoglossus occidentalis



Fin de risque

Evolution à suivre : elles vont chercher à hiverner en se cachant dans des endroits chauds et peuvent rentrer dans les maisons. Ce sont plutôt des ravageurs des cultures légumières et fruitières. *Leptoglossus occidentalis* est granivore, ravageur des cônes de pin.

Tenthredès

1 établissement concerné

Une attaque de la Tenthrede du bouleau, *Craesus septentrionalis*, a été observée sur *Salix* sp.

Attaque de la Tenthrede du bouleau
Craesus septentrionalis
sur saule marsault



Fin du risque

Evolution à suivre : dernière génération en cours, on ne va bientôt voir plus que les dégâts de squelette. Elles consomment les feuilles et ne laissent bien souvent que les nervures.

Des galles de la tenthrede gallicole du saule, *Euura viminalis*, ont été observées sur un lot de saule.



Fin du risque

Evolution à suivre : les larves ont quitté les galles des feuilles avant que celles-ci chutent et elles ont migré dans la litière du sol pour se nymphoser et rentrer en diapause hivernale.

Thrips

1 établissement concerné

Sous abri, de fortes attaques d'*Heliothrips haemorrhoidalis* ont été observées sur *Camellia* spp. et agrumes également avec des dégâts importants.

Dégâts et forte présence
d'*Heliothrips haemorrhoidalis*
sur *Camellia*



À surveiller !

Evolution à suivre : à surveiller particulièrement sous abris. La température est le facteur essentiel jouant sur le développement du thrips : plus la température est élevée, plus le cycle est rapide.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Les maladies

Oïdium

2 établissements concernés

A l'extérieur et sous abris, de fortes attaques ont été constatées sur *Quercus* spp., *Acer campestre* et *Rosa canina*.



À surveiller !

Evolution à suivre : l'oïdium prolifère à la faveur de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et de l'humidité.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez

Phytophthora

2 établissements concernés

Sous abris, des cas de *Phytophthora* ont été observés sur *Choisya ternata* 'Sundance' avec des flétrissements dans un établissement. Dans un second établissement, *Phytophthora nicotianae* a été détecté sur un lot fraîchement arrivé de négoce sur *Arbutus unedo*. Ce pseudo-champignon (oomycète) s'attaque principalement aux racines et au collet des jeunes plants, provoquant leur pourriture rapide et bloquant la sève, ce qui entraîne le flétrissement et la mort de la plante. Il se comporte rarement de manière aérienne comme ici. Ce cas évoque la complexité des *Phytophthora* pour lesquels les recherches scientifiques et taxonomiques se multiplient actuellement. L'identification en laboratoire est importante.



Phytophthora nicotianae
sur *Arbutus unedo*



À surveiller !

Evolution à suivre : les conditions ont été favorables à la propagation de la maladie. Pour limiter toute propagation, il convient de retirer les plantes atteintes et d'éviter l'eau stagnante lors des arrosages manuels ou par aspersion car ce champignon peut être véhiculé par l'eau. Le retour de pluviométrie peut être favorable à la propagation de la maladie.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Rouille

4 établissements concernés



Rouille modérée sur *Laburnum anagyroides*

A l'extérieur, des attaques modérées ont été observées sur *Laburnum anagyroides* et *Hypericum* spp. dans deux établissements. Des pustules orange à marron caractéristiques sont visibles sous les feuilles.

Sous abri, de fortes attaques sont observées sur *Dracaena indivisa* dans deux établissements.



À surveiller !

Evolution à suivre : la rouille est favorisée par le retour de la pluie. En cas de forte attaque, des défoliations précoces sont possibles.

Symptômes de galles de type *Agrobacterium*

1 établissement concerné



Des symptômes de galles de type *Agrobacterium* ont été à nouveau observés sur des sujets de négoce de *Salix integra* 'Hakuro-nishiki' greffés en tige au niveau du point de greffe.

Symptômes de galles de type
Agrobacterium sur
Salix integra 'Hakuro-nishiki'

Vérifiez vos stocks et vos réceptions !

Agrobacterium tumefaciens est notamment un **ORNQ** concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits. **Attention donc aux contaminations croisées potentielles en conservant ces plants !**



***Agrobacterium tumefaciens* et *Agrobacterium* spp. sont classés Organisme Réglementé Non de Quarantaine (ORNQ) : règlement d'exécution (UE) 2019/2072 Annexe IV partie J**

Bactéries		
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ	Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)	Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

La mise en circulation de végétaux contaminés est interdite.



Evolution à suivre : Afin de limiter l'introduction et la propagation d'*Agrobacterium*, la prévention demeure la meilleure méthode de lutte car une fois la plante infectée, il n'existe aucune méthode curative. Les plants doivent donc être détruits par incinération ou mis aux ordures ménagères pour être incinérés. La désinfection régulière des outils de travail est primordiale.

Méthode de lutte et prophylaxie :

- 👉 Achetez des plants sains !
- 👉 Désinfecter régulièrement les outils de taille et de greffe.



BASE ABAA Auxiliaires

Base ABAA



La bonne identification et connaissance des auxiliaires se révèle très utile dans le cadre de la protection intégrée. Cela permet de mieux connaître et estimer la régulation naturelle et d'ajuster ainsi les méthodes préventives mises en œuvre, et le choix des méthodes de lutte à appliquer, qu'elles soient chimiques ou non.

Les ressources qui concernent les auxiliaires sont disséminées sur des sites déjà en lien sur EcophytoPIC (*Ephytia*, *Fredon*, *Instituts Techniques Agricoles*,...) mais il n'est pas simple pour un internaute d'accéder rapidement à une donnée ciblée.

C'est pourquoi nous avons créé une base recensant à la fois les organismes utiles (Auxiliaires), nuisibles (BioAgresseurs) ainsi que les Accidents physiologiques et climatiques : la base ABAA.

LIENS UTILES



Tester vos connaissances sur les auxiliaires à travers ce quiz :

<https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/quiz-auxiliaires-des-cultures>



Les notes nationales biodiversité



La réglementation pour la protection des insectes pollinisateurs a évolué depuis fin 2021.

Cliquer ici pour télécharger la note d'information BSV-Abeille 2022

https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20220330-note_abeilles_2022.pdf



Cliquer ici pour découvrir les nouvelles dispositions réglementaires pour la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs <https://agriculture.gouv.fr/nouvelles-dispositions-reglementaires-pour-la-protection-des-abeilles-et-des-insectes>



« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent »

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages

Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur le site : <http://www.ecophytopic.fr/>



Résistance aux produits phytosanitaires :

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>



FOCUS FULGORE TACHETE OQ ET PREMIERE DETECTION EN EUROPE




Le Fulgore tacheté, *Lycorma delicatula*, est classé comme Organisme de Quarantaine. Cet insecte est originaire de Chine. Il a été introduit accidentellement en Corée et au Japon à plusieurs reprises avant de s'y développer durablement depuis 2004. Sa présence a été signalée aux États-Unis en septembre 2014 dans l'état de la Pennsylvanie, puis ses populations se sont rapidement répandues dans les États adjacents. Le Fulgore tacheté est polyphage : il se nourrit d'une grande diversité de plantes hôtes dont le pommier, la vigne et les arbres du genre *Prunus*, ainsi que des espèces ornementales et forestières. Les dégâts provoqués par ce ravageur sont causés par des prélèvements de sèves et des infestations importantes de *Lycorma delicatula* peuvent engendrer la mort des arbres sur lesquels ils s'alimentent.

Le Fulgore tacheté n'avait pas encore été signalé en Europe, mais on savait que les échanges commerciaux pouvaient entraîner son introduction accidentelle.

Il est signalé pour la première fois en Hongrie. À l'été 2026, un particulier a signalé à l'ONPV de Hongrie la présence d'un insecte non identifié dans son jardin dans le sud de la Hongrie. L'ONPV a prélevé des échantillons, et le ravageur a été confirmé. Des nymphes et des adultes ont été observés sur des *Parthenocissus* sp., et le particulier a indiqué avoir déjà observé cet insecte sur le même site en 2025. Des enquêtes complémentaires sont en cours pour déterminer l'ampleur et la durée de l'infestation, ainsi que la filière d'introduction éventuelle. Un lien éventuel avec des caisses en bois apportées sur la propriété est à l'étude. Des mesures d'éradication sont appliquées.



© Département de l'Agriculture des États-Unis, Domaine public



Fulgore tacheté adulte au repos, ailes repliées en toit sur son dos (A) et ailes déployées (B). (Crédits photo : Kenneth R.L. USDA APHIS PPQ; Bugwood.org; Rebekah D. Wallace, University of Georgia, Bugwood.org)

Pour en savoir plus :

- <https://gd.eppo.int/reporting/article-8502>
- <https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/programmes/strengthening-pest-outbreak-alert-and-response-systems/pest-alerts-d/6/>
- <https://www.inrae.fr/actualites/fulgore-tachete-menace-vignes-vergers-europe>
- <https://ephytia.inrae.fr/fr/C/27321/Agiir-Le-fulgore-tachete>

En cas de suspicion ou de détection, information immédiate auprès du SRAL Normandie
conformément à l'article L201-7 du CRPM.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau d'établissements professionnels d'horticulture, de pépinière et de jardinerie. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, les observations ne peuvent être transposées telles quelles à tous les établissements. FREDON Normandie dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les exploitants et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès de professionnels agréés.

Observations : FREDON Normandie, ASTREDHOR SM, Campus Métiers Nature de Coutances et producteurs

Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière

Rédaction et animation : Damien LOISEL - FREDON Normandie

Directeur de la publication : David PHILIPPART

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE n°16 du 22/10/2026 »

Coordination et renseignements : Damien LOISEL – damien.loisel@fredon-normandie.fr