

Un BSV lin fibre interrégional !

Animateurs référents :

Elodie GAGLIARDI
ARVALIS
06.30.65.55.03
e.gagliardi@arvalis.fr

Hervé GEORGES
Chambre d'Agriculture
de la Somme
06.86.37.56.41

h.georges@somme.chambagri.fr

A retenir

- **Lin fibre d'hiver :**
 - Les stades sont en avance et évoluent vite.
 - Surveillance courbure à réaliser
 - Premiers signalements d'oïdium
- **Lin fibre de printemps :**
 - Tous premiers semis en secteurs précoces

Compte tenu de la précocité des lins d'hiver cette année et de l'apparition des premiers bio-agresseurs, ce bulletin a été avancé de 15 jours par rapport à la dernière campagne.

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écophyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**


GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité


ARVALIS


CHAMBRES
D'AGRICULTURE
NORMANDIE


CHAMBRES
D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Avec le soutien financier de


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
Liberté
Égalité
Fraternité


OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

AGRO-METEO et SITUATION SUR LE TERRAIN

En lin d'hiver, les températures douces de fin d'hiver couplées à des semis qui ont été réalisés plus tôt que l'an dernier (centrés entre le 29 septembre et le 11 octobre) font que les stades sont bien avancés et ont globalement 15 jours d'avance par rapport à la campagne 2024-2025.

Sauf exception, la majorité des parcelles a surmonté les épisodes de gel, notamment grâce à une couche de neige (Episode du 6 janvier 2026).

LIN FIBRE D'HIVER

LE RESEAU D'OBSERVATIONS CETTE SEMAINE

	Calvados	Eure	Seine-Maritime	Oise	PDC	Nord	Somme
Lin d'hiver	2	3	4	1	2	1	5

Cette semaine, pour ce premier BSV lin de l'année, le réseau est constitué de 18 parcelles de lin fibre d'hiver réparties sur l'ensemble de la zone de production.

Lin fibre

Normandie - Hauts-de-France

STADES



Cette semaine, sur les 18 parcelles d'observation :

- 12 sont au stade D2 : 20 cm ; il s'agit globalement de semis réalisés fin septembre tout début octobre – en tout secteur de production
 - 6 sont au stade D1 : 10 cm ; semis effectués autour du 10 octobre en général.
- L'an dernier au 25 mars, seules 8 parcelles sur 35 avaient atteint le stade D2 – 20 cm.

Lin au stade D2 – Semis du 30/09/2025 – Bouchon (80)
(Photo H. GEORGES CA 80)

Lin au stade D1 – Semis du 10/10/2025 – Bouchon (80)
(Photo H. GEORGES CA 80)



OBSERVATIONS

OIDIUM

Tout aussi surprenant cette année, l'apparition précoce de l'oïdium par rapport à la date. Malgré tout l'apparition de l'oïdium au stade D2 est moins surprenante.



Sur les 18 parcelles, 7 font l'objet d'une détection de cette maladie (38%). Dans ces parcelles touchées, la fréquence moyenne est de 17% de pieds touchés avec une variation allant de 2 à 80 %.

Cette pression est constatée en tout secteur, principalement au stade D2 mais aussi dès le stade D1 et est vraisemblablement liée aux conditions sèches connues depuis quelques jours.



Oïdium sur feuilles (H GEORGES CA 80)

Lin fibre

Normandie - Hauts-de-France

Seuil de nuisibilité : dès apparition des premières étoiles

Analyse du risque :

Une hygrométrie forte au sol et une végétation luxuriante (fortes densités, fertilisation azotée excessive, ...) sont des facteurs à risque. La pression oïdium est bien là mais devrait baisser si des pluies surviennent comme annoncé.

Méthodes alternatives :

- **Prophylaxie :**
 - Respect d'un intervalle d'au moins 6 ans entre deux lins
 - Lutte variétale
 - La densité de semis
 - Raisonnement de la fertilisation azotée

THRIPS

Trois parcelles du réseau (sur 18) font l'objet d'une détection de thrips cette semaine mais à des niveaux inférieurs au seuil.

Les thrips auront profité des conditions orageuses connues ces dernières semaines. Les pluies annoncées devraient leur être défavorables, au moins quelques temps.



Seuil de nuisibilité : 5 Thrips par balayage

Analyse du risque :

Le risque serait de nouveau présent si des conditions orageuses se confirment.

Méthodes alternatives :

Aucune méthode alternative n'existe à ce jour

KABATIELLA LINI – COURBURE DE LA TIGE

C'est la principale maladie à surveiller chaque sortie d'hiver.



Elle est présente sur 11 parcelles sur 18 (61%) avec une fréquence parmi les parcelles touchées allant de 5 à 65 % (moyenne 14.5%) de pieds touchés.

La pression est malgré tout plus faible que la campagne passée puisque l'an dernier, au 25 mars, 70 % des parcelles étaient concernées avec 20% des pieds touchés.

La progression de cette maladie semble avoir stagné depuis quelques jours mais pourrait reprendre à la faveur de nouvelles pluies.

Lin fibre

Normandie - Hauts-de-France

Seuil de nuisibilité : Sur septoriose et Courbure de la tige, il n'existe pas de « réel seuil »

Analyse du risque :

Les risques d'expression de la courbure sont plus importants en conditions très poussantes (terre réchauffée, humidité) car sont à l'origine de déchirements de l'épiderme, voies d'entrée possible de l'agent pathogène. **La vigilance est donc recommandée lors du retour de conditions pluvieuses.**

Méthodes alternatives :

La lutte est essentiellement préventive :

- Respect d'un intervalle d'au moins 6 ans entre deux lins
- Raisonnement des apports d'azote
- Nettoyage méticuleux des matériels de récolte
- Destruction des débris végétaux et des adventices

LIN-FIBRE-DE-PRINTEMPS..¶

Seuls dans quelques secteurs – secteurs maritimes avec des terres légères - les semis ont pu commencer.

En bonnes terres – secteurs avec des terres plus lourdes - rien ne presse entre des sols peu ressuyés et des pluies annoncées