



UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Intervention 70.10 : Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) pour la préservation de l'équilibre agro-écologique et de la biodiversité de milieux spécifiques

## **Notice de la mesure « Surfaces herbagères et pastorales »**

**NO\_LPAN\_PRA1**

**Territoire « 9 - Lieuvin Pays d'Auge Natura 2000 »**

**Campagne 2023**

Pour toute information complémentaire, contacter la structure animatrice de la mesure :

*Communauté de Communes Lieuvin Pays d'Auge*

*21 bis rue de Lisieux 27230 THIBERVILLE*

02 32 42 80 88 – [accueil@lieuvinpaysdauge.fr](mailto:accueil@lieuvinpaysdauge.fr)

02 32 42 80 60 - [cecile.chefdeville@lieuvinpaysdauge.fr](mailto:cecile.chefdeville@lieuvinpaysdauge.fr)

## 1 OBJECTIFS DE LA MESURE

---

Cette mesure vise à préserver la durabilité et l'équilibre agro-écologique des prairies permanentes à flore diversifiée qui sont à la fois des habitats naturels et des habitats d'espèces produisant un fourrage de qualité et souple d'utilisation.

Cette mesure porte en particulier sur les surfaces pastorales qui sont valorisées durablement, notamment par des entités collectives. Ces entités assurent en effet la gestion par le pâturage d'une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute valeur environnementale d'alpages, d'estives et de marais.

## 2 MONTANT DE LA MESURE

---

En contrepartie du respect de l'ensemble des exigences du cahier des charges de cette mesure, **une aide de 51 € par hectare et par an** sera versée pendant la durée de l'engagement.

Votre engagement sera plafonné à hauteur de 16 000 € par an.

## 3 CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

---

Les critères d'éligibilité doivent être respectés tout au long du contrat. En cas de non-respect en première année, la mesure ne peut pas être souscrite. En cas de non-respect les années suivantes, le contrat est automatiquement rompu sur la totalité des éléments engagés s'il s'agit du non-respect d'un critère d'éligibilité relatif au demandeur, ou uniquement sur la surface en anomalie s'il s'agit d'un critère d'éligibilité relatif à la surface. Le cas échéant, des sanctions peuvent être appliquées.

### 3.1 Critères d'éligibilité relatifs au demandeur

Les bénéficiaires suivants sont éligibles à la mesure :

- Les agriculteurs actifs tels que définis conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles sont considérés comme des agriculteurs actifs ;

- Les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;
- Les entités collectives.

Est qualifiée de « collective » toute utilisation de surface à plusieurs éleveurs, que les animaux soient ou non regroupés en un troupeau commun. Dans ces conditions, les groupements pastoraux sont éligibles ainsi que toutes les formes d'entités collectives juridiquement constituées et dotées de la personnalité morale dès lors qu'elles gèrent en responsabilité directe des surfaces dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles en organisent l'utilisation collective notamment par les troupeaux de leurs membres ou ayants droit.

Les GAEC sont éligibles avec application du principe de transparence.

### 3.2 Critères d'éligibilité relatifs aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles à cette mesure sont les **prairies et pâturages permanents**.

Se référer au point 7.2 de la notice.

## 4 CRITÈRES D'ENTRÉE

---

Les critères suivants conditionnent l'accès à la mesure en première année d'engagement uniquement et ne sont plus vérifiés par la suite. En cas de non-respect, l'exploitation n'est pas engagée dans la mesure.

Les critères d'entrée pour cette mesure sont les suivants :

- ✓ Pour chaque parcelle, avoir au moins une partie de la surface présente dans le PAEC ;
- ✓ Réaliser un diagnostic agro-écologique de l'exploitation. Le diagnostic de l'exploitation doit être transmis à la DDT(M) au plus tard au 15 septembre de la première année d'engagement. En cas de non-transmission, le dossier ne pourra pas être engagé cette année-là.

## 5 CRITÈRES DE PRIORISATION DES DOSSIERS

---

Ces critères permettent de classer les demandes d'aide des demandeurs éligibles (c'est-à-dire respectant tous les critères d'entrée et les critères d'éligibilité) par ordre de priorité afin notamment de tenir compte des enveloppes budgétaires et des orientations définies par la Commission régionale agroenvironnementale et climatique (CRAEC). Les dossiers sont engagés par ordre de priorité en fonction des critères décrits dans la notice du territoire.

### Principes de priorisation :

MAEC des PAEC à enjeu biodiversité (hors MAEC HBV)

Cf. AAP PAEC 2022 – Normandie - annexe 10

Rang de priorité	Critères de priorisation
1	- Fiche liaison conforme (toutes les MAEC) - Agriculteur à titre principal pour toutes les MAEC systèmes
2	PAEC à enjeu biodiversité : toutes les MAEC sont de niveau 2 (hors MAEC HBV)

## **6 CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE**

---

Sauf mention contraire, l'ensemble des obligations du cahier des charges doit être respecté sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire à partir de la date limite de dépôt des dossiers PAC de l'année d'engagement et durant les 5 années suivantes. En cas de non-respect d'une obligation, des sanctions peuvent s'appliquer en fonction de la nature et de la gravité de l'anomalie.

Les documents relatifs à la demande d'engagement et au respect des obligations doivent être conservés pendant toute la durée de l'engagement et pendant les quatre années suivantes. Ils pourront notamment être demandés en cas de contrôle de l'exploitation. **Les obligations du cahier des charges figurent ci-dessous.**

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction <sup>1</sup>
Formation à réaliser au cours des deux premières années de l'engagement. Se référer au point 7.1.	<b>Avant le 15 mai 2025</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification de l'attestation de formation	Anomalie réversible, dossier, totale, d'importance égale à 0,06.
<i>Pour les entités collectives uniquement :</i> Respecter une plage d'effectifs herbivores d'un minimum de 20 UGB et d'un maximum de 1500 UGB sur l'ensemble des surfaces utilisées dans un cadre collectif. Se référer au point 7.3.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle administratif</b> Vérification du formulaire de montée et descente d'estive	Anomalie réversible, dossier, totale, d'importance égale à 0,4.
Ne pas détruire le couvert. Un renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé au cours de l'engagement.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie définitive, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter les indicateurs suivants sur les surfaces engagées : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique ;</li> <li>➤ Respect du niveau de prélèvement par le pâturage ;</li> <li>➤ Absence de dégradation du tapis herbacé ;</li> <li>➤ Accessibilité du milieu et valorisation.</li> </ul> Se référer au point 7.4.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter une utilisation annuelle minimale des surfaces engagées par pâturage ou fauche.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter l'interdiction de fertilisation azotée minérale.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Enregistrer les interventions sur toutes les parcelles engagées :	<b>Sur toute la</b>	<b>Contrôle sur place</b>	Anomalie réversible, localisée, totale,

<sup>1</sup> Se référer à la notice nationale MAEC-Bio pour plus d'information sur le fonctionnement du régime de sanction.

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identification des surfaces, conformément aux informations du registre parcellaire graphique (RPG) et du descriptif des parcelles ;</li> <li>➤ Modalités d'utilisation des parcelles (dates d'entrée et de sortie des animaux, nombre d'animaux et UGB correspondantes, dates de fauche, ...) ;</li> <li>➤ Modalités d'entretien des éléments (matériel utilisé, dates d'interventions, durée d'intervention) ;</li> <li>➤ Fertilisation azotée minérale des surfaces (dates, produits, quantités) ;</li> <li>➤ Traitements phytosanitaires (dates, produits, quantités).</li> </ul> <p><b>ATTENTION :</b> Le cahier d'enregistrement constitue une pièce indispensable au contrôle de plusieurs obligations. Aussi, l'absence ou la non-teneur de ce cahier constatée le jour du contrôle se traduira par le constat d'anomalies et le cas échéant par l'application du régime de sanction pour toutes les obligations ne pouvant être contrôlées.</p>	<p><b>durée du contrat</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques</p>	<p>d'importance égale à 0,05.</p>

## 7 PRÉCISIONS

### 7.1 Formation

L'exploitant doit suivre une des formations suivantes :

- Bien exploiter ses analyses de sol pour optimiser sa fertilisation ;
- Améliorer sa gestion des prairies en zone humide.

### 7.2 Définition des prairies et pâturages permanents

**Les surfaces en prairies et pâturages permanents** correspondent aux surfaces de la catégorie 1.6 de la notice télépac « Liste des cultures et précisions », rendues admissibles par l'application d'un prorata spécifique à cette MAEC :

- Lorsque la densité d'éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieure à 80 %, la surface n'est pas admissible (prorata égal à 0 %).
- Dans les autres cas, le prorata est de 100 % et la surface est donc entièrement admissible.

### 7.3 Animaux pris en compte pour le calcul des effectifs

Catégorie	Taux de conversion en UGB	Période de référence
Bovins de plus de 2 ans	1	Moyenne sur les 12 mois précédant la date limite de dépôt des dossiers PAC.  Pour un nouvel éleveur bovin, il est possible de s'appuyer sur le nombre instantané des UGB présentes sur l'exploitation à la date limite de dépôt de la demande d'aides de la campagne considérée.
Bovins entre 6 mois et 2 ans	0,6	
Bovins de moins de 6 mois	0,4	
Équidés de plus de 6 mois	1	30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année n.  Le critère d'âge est vérifié au plus tard le 1 <sup>er</sup> jour des 30 jours incluant le 31 mars pendant lesquels les animaux sont présents sur l'exploitation. Pour les nouveaux installés après le 31 mars, les effectifs déclarés sont ceux qui sont présents à la date limite de dépôt de la demande d'aides de la campagne considérée.
Ovins et caprins de plus de 1 an et femelles de moins de 1 an ayant mis bas	0,15	
Ovins et caprins de moins de 1 an	0	
Lamas de plus de 2 ans	0,45	
Alpagas de plus de 2 ans	0,3	
Cerfs et biches de plus de 2 ans	0,33	
Daims et daines de plus de 2 ans	0,17	

Pour les entités collectives, le nombre d'animaux pris en compte correspond à ceux effectivement reçus en transhumance l'année de la campagne PAC. Vous devez déclarer ce nombre sur le formulaire « Déclaration de montée et de descente d'estives » et le renvoyer à la DDT(M) au plus tard **le 15 novembre** de l'année de la campagne PAC.

L'ensemble des animaux détenus sont comptabilisés, sans tenir compte du temps de présence des animaux sur les surfaces des entités collectives (colonne « Nombre UBG » dans le formulaire de montée et descente d'estive).

#### 7.4 Indicateurs

##### **Plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique :**

*Cet indicateur s'adresse aux prairies permanentes à flore diversifiée et à certaines surfaces pastorales.*

Vous devez vérifier sur chaque tiers de parcelle la présence d'un minimum de 4 plantes indicatrices du bon état agro-écologique des surfaces parmi la liste des plantes définie localement et annexée à la présente notice.

*Cf. Annexe 1*

##### **Prélèvement par le pâturage :**

*Cet indicateur s'adresse aux surfaces pastorales où la ressource herbacée est prédominante.*

Vous devez respecter sur 80 % de la surface admissible corrigée par la méthode du prorata<sup>1</sup> un niveau de prélèvement compris entre les classes 2 et 5 de la grille nationale d'évaluation annexée à la présente fiche. Cette obligation vise à exclure les modes de gestion correspondant à des passages rapides du troupeau (sous-pâturage).

*Cf. Annexe 2*

##### **Absence de dégradation du tapis herbacé :**

*Cet indicateur s'adresse aux surfaces pastorales (ressource herbacée ou ligneuse prédominante).*

Vous devez respecter sur ces milieux pâturés par les différents herbivores (hors parcs de nuit) :

- L'absence de plantes déchaussées sur plus de 5 % de la surface admissible corrigée par la méthode du prorata<sup>1</sup>;
- L'absence de plantes indicatrices d'eutrophisation sur plus de 10 % de la surface admissible corrigée par la méthode du prorata<sup>1</sup>. La liste des plantes indicatrices d'eutrophisation est définie localement et annexée à la présente notice.

*Cf. Annexe 3*

##### **Indicateurs témoignant de l'accessibilité du milieu et de sa valorisation pour l'alimentation du troupeau :**

*Cet indicateur s'adresse aux surfaces pastorales où la ressource ligneuse est prédominante.*



Les indicateurs que vous devez respecter sont les suivants :

- Traces de prélèvement sur la ressource (rejets, jeunes pousses, feuilles consommables des branches basses ou des autres ligneux consommables) sur 80 % de la surface admissible corrigée par la méthode du prorata<sup>1</sup>, ce qui témoigne du fait que le milieu est pénétrable et qu'il est effectivement valorisé pour l'alimentation du troupeau ;
- Traces de passage et de circulation (laine, poils, déjection) à préciser selon l'espèce au pâturage.

<sup>1</sup> Lorsque la densité d'éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieure à 80%, la surface n'est pas admissible (prorata égal à 0 %).

Dans les autres cas, le prorata est de 100 % et la surface est donc entièrement admissible.

### 7.5 Lien avec la conditionnalité et l'écorégime

En cas de non-respect de la conditionnalité, l'ensemble des aides PAC sont sanctionnées, y compris les aides MAEC.

Les obligations du cahier des charges de la MAEC sont distinctes des exigences de l'écorégime. Un agriculteur peut à la fois souscrire cette MAEC et bénéficier de l'écorégime.

## ANNEXE 1 : Liste des plantes indicatrices de l'équilibre écologique

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës	<i>Juncus acutiflorus</i>
Jonc articulé	<i>Juncus articulatus</i>
Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux	<i>Juncus subnodulosus</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>
Wahlenbergie à feuilles de lierre	<i>Wahlenbergia hederacea</i>
Centaurée	<i>Centaurea</i>
Reine-des-prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>
Scabieuse colombaire ; Colombaire	<i>Scabiosa columbaria</i>
Succise des prés ; Mors du diable	<i>Succisa pratensis</i>
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>
Lotier à feuilles ténues	<i>Lotus glaber</i>
Lotier des fanges	<i>Lotus pedunculatus</i>
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>
Luzule à inflorescences denses	<i>Luzula congesta</i>
Luzule multiflore	<i>Luzula multiflora</i>
Grande marguerite (tétraploïde)	<i>Leucanthemum irtutianum</i>
Grande marguerite (diploïde)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Myosotis bicolor ; Myosotis versicolore	<i>Myosotis discolor</i>

Myosotis douteux	<i>Myosotis dubia</i>
Myosotis cespiteux	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i>
Myosotis à poils réfractés	<i>Myosotis nemorosa</i>
Myosotis des marais	<i>Myosotis scorpioides</i>
Myosotis rampant	<i>Myosotis secunda</i>
Oenanthe fistuleuse	<i>Oenanthe fistulosa</i>
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Oenanthe à feuilles de peucedan	<i>Oenanthe peucedanifolia</i>
Oenanthe faux-boucage	<i>Oenanthe pimpinelloides</i>
Oenanthe à feuilles de silaüs	<i>Oenanthe silaifolia</i>
Sélin à feuilles de carvi	<i>Selinum carvifolia</i>
Silaüs des prés	<i>Silaum silaus</i>
Orchis punaise ; Orchis à odeur de punaise	<i>Anacamptis coriophora</i>
Orchis à fleurs lâches	<i>Anacamptis laxiflora</i>
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>
Orchis de Fuchs ; Dactylorhize de Fuchs	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>
Orchis incarnat ; Dactylorhize incarnat	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
Orchis tacheté ; Dactylorhize tacheté	<i>Dactylorhiza maculata</i>
Orchis de mai ; Dactylorhize de mai	<i>Dactylorhiza majalis</i>
Orchis négligé ; Dactylorhize négligé	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>
Orchis grenouille ; Orchis vert	<i>Dactylorhiza viridis</i>
Épipactis des marais	<i>Epipactis palustris</i>
Gymnadénie moucheron ; Orchis moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>
Listère à feuilles ovales ; Double-feuille	<i>Neottia ovata</i>
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>
Platanthère à fleurs verdâtres	<i>Platanthera chlorantha</i>
Orobanche du gaillet	<i>Orobanche caryophyllacea</i>
Orobanche à petites fleurs	<i>Orobanche minor</i>
Orobanche pourpre	<i>Phelipanche purpurea</i>
Conopode dénudé	<i>Conopodium majus</i>
Laïche printanière	<i>Carex caryophyllea</i>
Laïche déprimée	<i>Carex demissa</i>
Laïche étoilée	<i>Carex echinata</i>
Laïche glauque	<i>Carex flacca</i>
Laïche des lièvres	<i>Carex leporina</i>
Laïche pâle	<i>Carex pallescens</i>
Laïche bleuâtre	<i>Carex panicea</i>
Polygala à feuilles de serpolet	<i>Polygala serpyllifolia</i>
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i>
Rhinanthe à feuilles étroites	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Petit rhinanthe ; Rhinanthe à petites fleurs	<i>Rhinanthus minor</i>
Scorsonère des prés	<i>Scorzonera humilis</i>
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>
Petite pimprenelle	<i>Poterium sanguisorba</i>
Sanguisorbe officinale ; Pimprenelle des bois	<i>Sanguisorba officinalis</i>
Scirpe à tiges nombreuses	<i>Eleocharis multicaulis</i>
Scirpe des marais ; Héléocharis des marais	<i>Eleocharis palustris</i>
Scirpe à une écaille ; Héléocharis à une écaille	<i>Eleocharis uniglumis</i>
Thym de Druce	<i>Thymus drucei</i>
Thym couché	<i>Thymus praecox</i>

Thym commun	<i>Thymus pulegioides</i>
Thym sauvage	<i>Thymus serpyllum</i>
Luzerne lupuline, Minette	<i>Medicago lupulina</i>
Trèfle douteux, Petit trèfle jaune	<i>Trifolium dubium</i>
Renouée bistorte ; Bistorte	<i>Bistorta officinalis</i>
Chlore perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata</i>
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>
Populage des marais ; Souci d'eau	<i>Caltha palustris</i>
Cardamine des prés ; Cresson des prés	<i>Cardamine pratensis</i>
Cirse d'Angleterre	<i>Cirsium dissectum</i>
Colchique d'automne	<i>Colchicum autumnale</i>
Orge faux-seigle	<i>Hordeum secalinum</i>
Hydrocotyle commun ; Écuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>
Silène fleur-de-coucou ; Lychnis fleur de coucou	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Parnassie des marais	<i>Parnassia palustris</i>
Potentille tormentille ; Tormentille	<i>Potentilla erecta</i>
Primevère officinale ; Coucou	<i>Primula veris</i>
Petite douve, Renoncule flammette	<i>Ranunculus flammula</i>
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>
Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles	<i>Saxifraga granulata</i>
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>
Carvi verticillé	<i>Trocdaris verticillatum</i>
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>

**Voir aussi les planches d'illustration des plantes indicatrices dans le document des CBN de Bailleul et Brest intitulé « Note méthodologique sur l'établissement de la liste de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique dans les surfaces herbagères de Normandie »**

**Ce document est disponible sur le site internet de la DRAAF :**

<https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/cahiers-des-charges-maec-faq-notes-techniques-a2947.html>

**Cliquer sur le fichier intitulé "Note du CBN - liste de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique dans les surfaces herbagères en Normandie"**

## ANNEXE 2 :

### Annexe : Grille nationale d'évaluation du niveau de prélèvement par le pâturage (Source : CERPAM, 2013)

Celle-ci a été construite et étalonnée sur la base de coupes de phytomasse et de transects avant et après pâturage qui ont été comparés à l'état visuel du tapis herbacé après pâturage. Cinq classes de prélèvement ont ainsi été définies.

	OBSERVATIONS VISUELLES	Prélèvement herbacé	Mode de gestion
1	Traces de passage rapide du troupeau : coups de dents épars, herbe plus ou moins couchée dans faciès productif, quelques crottes présentes.	< 20 %	Passage rapide
2	Prélèvement herbacé faible : les bonnes espèces constituant le fin (légumineuses, bonnes graminées, autres), sont consommées irrégulièrement ; le risque de gaspillage est important (herbe couchée dans faciès productif). <i>Coups de dents épars sur feuillages arbustifs les plus appétents</i>	20 à 40 %	Tri
3	Prélèvement herbacé irrégulier : dans l'ensemble, le fonds pastoral est consommé ; les espèces moins appétentes sont consommées partiellement et irrégulièrement par taches ou trouées ; peu d'incursions dans les zones embroussaillées moins pénétrables (pâturage concentré sur les zones ouvertes). Le stock sur pied en sec n'est pas attaqué. <i>Les feuillages les plus appétents sont partiellement prélevés, pas d'impact sur les autres arbustifs consommables.</i>	40 à 60 %	Pâturage prudent
4	Prélèvement herbacé important : l'ensemble de la strate herbacée est mangé assez régulièrement ; il subsiste des touffes de refus ; exploration très partielle des plages embroussaillées moins pénétrables, qui se traduisent au fil des temps par quelques passages visibles. Pâturage régulier d'au moins 80 % de la surface accessible Le stock sur pied en sec (de l'année précédente) est peu attaqué par les ovins, plus par les bovins et les équins. <i>Impact visible sur arbustifs consommables.</i>	60 à 80 %	Gestion
5	Pelouse raclée : l'ensemble de la strate herbacée est très bien consommée, avec un aspect de la pelouse ras et régulier ; les refus d'espèces grossières sont rares ou inexistantes ; les espèces les moins appétentes sont irrégulièrement consommées (carex toujours vert, brachypode de Phénicie). Exploration des plages embroussaillées denses et peu pénétrables (épineux) ; ouverture de passages bien marqués. Pâturage régulier de la totalité de la surface accessible Prélèvement marqué dans le stock sur pied en sec (de l'année précédente), plus complet par bovins et équins. <i>Impact important sur arbustifs consommables.</i>	80 à 100 %	Impact

### ANNEXE 3 : Liste des plantes indicatrices d'eutrophisation

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Pissenlit commun	<i>Taraxacum officinale</i>
Oseille commune	<i>Rumex acetosa</i>
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>
Seneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>
Chardon crépu	<i>Carduus crispus</i>
Melilot blanc	<i>Melilotus albus</i>
Melilot officinal	<i>Melilotus officinalis</i>
Gailler gratteron	<i>Galium aparine</i>
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>
Cynoglosse officinal	<i>Cynoglossum officinale</i>
Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>
Epinard sauvage	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>
Grande cigüe	<i>Conium maculatum</i>