



Animateur référent

Benoit COIFFIER
FREDON BN
02.31.46.96.54
06.77.60.09.73
b.coiffier.fredonbn@orange.com

Animateur suppléant

Solenn LE GALL
FLORYSAGE
02.35.95.97.07
Solenn.le-gall@astredhor.fr

Directeur de la publication

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre
régionale d'agriculture de
Normandie

BSV consultable sur les sites
des DRAAF, des Chambres
d'agriculture

Abonnez-vous sur
www.normandie.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé
de l'agriculture, avec l'appui financier
de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions
diffuses attribués au financement du
plan Ecophyto.



Ce bulletin a été rédigé à partir d'observations ponctuelles et/ou des relevés de piégeages réalisés par les FREDON de Basse et Haute Normandie, FLORYSAGE, le CREPAN et 7 collectivités.

L'essentiel

Les conditions du mois de juillet n'ont pas été propices au développement de maladies ni au développement de parasites.

Les informations les plus importantes du mois sont les captures de pyrale du buis qui sont toujours en cours avec la présence de nouvelles chenilles et le coup de chaud subi par des végétaux lors de la semaine 29 dont principalement l'hortensia.

Météorologie

Suite à un problème technique, il n'y a pas de données météorologiques pour ce mois de juillet.

On peut tout de même noter le gros coup de chaleur sur la région lors de la semaine 29 qui a provoqué des forts dessèchements sur certains végétaux.

Arbustes/Rosiers

• Buis

- Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) :

Stade de développement observé : des nouvelles chenilles sont constatées. Ces chenilles sont issues des accouplements d'adultes qui ont commencés en semaine 26 (premiers relevés positifs de piégeage).

Dégâts observés – incidence : début de défoliations identifiés qui vont s'intensifier.

Secteur d'observation : Caen (14) sur une zone infestée en 2015.

Facteurs de risques : les chenilles vont continuer à se développer provoquant ainsi une défoliation des buis touchés.

Méthodes prophylactiques : il n'y a pas de méthode prophylactique efficace.



Chenille de pyrale du buis

• Hortensia

- Dessèchement :

Dégâts observés – incidence : des dessèchements de feuilles et de bouquets floraux sont présents depuis le coup de chaleur de la semaine 29. Les feuilles resteront marquées.

Secteur d'observation : toute la région.



Dessèchement sur hortensia

• Rosiers

- Maladie des taches noires (*Marssonina rosae*):

Dégâts observés – incidence : taches noires violacées, de taille variable et de contours irréguliers, se développant sur les feuilles, qui se mettent rapidement à jaunir et à tomber. L'intensité des attaques a très peu évoluée depuis le mois de juin.

Secteur d'observation : agglomération caennaise (14)

Facteurs de risques : cf. BSV précédent.

Méthodes prophylactiques : cf. BSV précédent.

Arbres

• Marronnier

- Mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*) :

Dégâts observés – incidence : l'intensité des attaques est en augmentation et est variable selon les sites. On note tout de même, une plus faible intensité que l'année précédente.

Secteur d'observation : toute la région

Facteurs de risques : les générations s'enchainent et continuent à coloniser les arbres.

● **Orme**

- Graphiose de l'orme (*Ophiostoma ulmi*) :

Dégâts observés – incidence : depuis le début du mois, les jeunes ormes contaminés par la graphiose dans les haies ont commencé à se dessécher. Le phénomène s'est accéléré avec le coup de chaleur. Les premières chaleurs de juillet révèlent l'état de contamination des ormes par le dessèchement brutal du houppier.

La contamination se fait de proche en proche par le système racinaire, ou à longue distance par les scolytes.

Secteur d'observation : toute la région.

Suivi piégeage de la Pyrale du Buis en Normandie



8 collectivités du réseau Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures et 11 établissements de la filière Cultures ornementales participent à ce dispositif de piégeage réalisé en partenariat avec le BSV Cultures ornementales. Les pièges ont été installés semaine 15.

		Piégeage de la Pyrale du buis				
		Basse-Normandie			Haute-Normandie	
		Calvados	Manche	Orne	Seine-Maritime	Eure
	BSV Cultures Ornementales	3 établissements	1 établissement	1 établissement	5 établissements	1 établissement
	BSV JEVI	1 collectivité	1 collectivité	2 collectivités	1 collectivité	3 collectivités
Relevé n°9	Semaine 24	0	0	0	0	0
Relevé n°10	Semaine 25	0	0	0	0	0
Relevé n°11	Semaine 26	2	0	0	0	0
Relevé n°12	Semaine 27	3	0	0	0	0
Relevé n°13	Semaine 28	8	0	0	0	0
Relevé n°14	Semaine 29	2	0	0	0	0
Relevé n°15	Semaine 30	6	0	0	0	0

Crédit photos : FREDON Basse-Normandie