

UN BSV lin fibre inter-régional !

A retenir

- Les parcelles suivies se situent actuellement majoritairement entre les stades 10 cm et 20 cm.
- Des premières étoiles d'oïdium sur feuille ont été recensées dans des parcelles flottantes. Ces parcelles sont localisées uniquement dans le Calvados actuellement.

Animateurs référents

Cynthia TORRECILLAS
ARVALIS
02.32.07.07.54
c.torrecillas@arvalis.fr

Hervé GEORGES et
Isabelle DOUAY
Chambre d'agriculture
03.22.20.67.32
h.georges@somme.chambagri.fr

03.21.73.10.18
isabelle.douay@npdc.chambagri.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président de la Chambre
régionale d'agriculture de
Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires du
programme

Abonnez-vous sur

www.normandie.chambres-agriculture.fr
www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

Action du plan Ecophyto pilotée
par les Ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de
la santé et de la recherche avec
l'appui technique et financier de
l'Office Français de la Biodiversité



ARVALIS
Institut du végétal


ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Agro-météo

Sous l'action des conditions météorologiques pluvieuses associées à des températures douces de la fin de semaine dernière, les linières ont continué leur progression. Des températures fraîches se sont installées en début de semaine mais un retour à la hausse est annoncé dans les prochains jours et devrait donc être favorable à la croissance des lins.

Le réseau d'observation

Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 38 parcelles fixes en Normandie et 22 parcelles fixes dans les Hauts de France.



Stades phénologiques

Suivi des stades du Lin fibre BSV inter-régional 2020





Photo : Vincent Delouye – NATUP :
Parcelle avec de la double levée dans l'Eure (27)



Photo : Claude GAZET – CA 59-62 :
Parcelle de lin à 10 cm à Sebourg (59)



Photo : François D'HUBERT – CA 76 :
Parcelle de lin à 18 cm à Illois (76)



Photo : François D'HUBERT – CA 76 :
Parcelle avec de la double levée à Smermesnil (76)

Observations

Surveillance thrips

Aucune parcelle du réseau ne fait mention de la présence de ce ravageur cette semaine.

Période du risque :

Dès le mois d'avril (sortie des premières générations) la surveillance est de rigueur quel que soit le stade du lin.

Analyse du risque

Des conditions climatiques chaudes et humides sont très favorables à son activité. La surveillance est recommandée.

Seuil de nuisibilité : 5 Thrips par balayage

-Sur lin inférieur à 20 cm : envelopper les têtes dans un sac en plastique humide et secouer celui-ci.

-Sur lin supérieur à 20cm, procéder au balayage avec une main humide

Surveillance oïdium

Aucun symptôme n'est signalé cette semaine dans les parcelles fixes du réseau. En revanche, des observations dans des parcelles flottantes situées dans le Calvados font mention de l'arrivée des premières étoiles sur feuille.

Période du risque

C'est à partir du stade D1 (10 cm) que commence la surveillance de la moisissure blanche provoquée par *Oidium lini*.

L'observation visuelle de l'ensemble des feuilles de la tige est primordiale pour bien détecter l'arrivée de la maladie.

Le mycélium blanc apparaît sur les feuilles puis sur les tiges, d'abord sous forme d'étoiles, ensuite sous forme d'un feutrage.

Analyse du risque

Une forte hygrométrie la nuit et un temps sec et chaud le jour favorisent le développement de la maladie. Actuellement, le risque est donc présent.

Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières étoiles sur feuilles
