



Animateur référent

Benoit COIFFIER
FREDON BN
02.31.46.96.54
06.77.60.09.73
b.coiffier.fredonbn@orange.com

Animateur suppléant

Solenn LE GALL
FLORYSAGE
02.35.95.97.07
Solenn.le-gall@astredhor.fr

Directeur de la publication

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre
régionale d'agriculture de
Normandie

BSV consultable sur les sites
des DRAAF, des Chambres
d'agriculture

Abonnez-vous sur
www.normandie.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé
de l'agriculture, avec l'appui financier
de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions
diffuses attribués au financement du
plan Ecophyto.



Ce bulletin a été rédigé à partir d'observations ponctuelles et/ou des relevés de piégeages réalisés par les FREDON de Basse et Haute Normandie, FLORYSAGE, le CREPAN et 7 collectivités.

L'essentiel

Les conditions climatiques de ce mois d'août n'ont pas été propices au développement de maladies ni au développement de parasites. L'état sanitaire des végétaux est bon. On observe seulement des dessèchements de végétaux conséquence des faibles précipitations, de températures élevées et d'un vent chaud certaines journées.

L'information la plus importante est la reprise des captures de pyrale du buis.

Météorologie

Comme abordé dans le préambule, les conditions climatiques de ce mois d'août ont été chaudes et sèches. Les températures sont en moyennes 1,3°C au-dessus des normales de saisons et la pluviométrie moyenne est bien en-dessous des normales de saison.

Vous trouverez ci-dessous les moyennes de températures et de pluviométries pour la Basse-Normandie (problèmes techniques pour la Haute-Normandie) jusqu'au 28 août inclus.

Août	Température moyenne (en °C)	Normale de saison (en °C)	Pluviométrie moyenne (en mm)	Normale de saison (en mm)
Caen	18,7	17,6	15	47
Argentan	19	17,4	16,7	36,3
Pont-Hébert	18,3	17,2	33,5	57,6

Vous trouverez ci-dessous les données du mois de juillet qui n'avaient pas pu être fournies lors du dernier BSV suite à un problème technique.

Juillet	Température moyenne (en °C)	Normale de saison (en °C)	Pluviométrie moyenne (en mm)	Normale de saison (en mm)
Caen	18	17,4	18,2	44,8
Argentan	18,2	17,6	13,1	50,4
Pont-Hébert	17,4	17	26,8	51

Arbustes/Rosiers

• Buis

- Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) :

Stade de développement observé : toutes les chenilles observées rentrent en nymphose.

Dégâts observés - incidence : les dégâts observés cette année restent faibles.

Secteur d'observation : Caen (14) sur une zone infestée en 2015.

Facteurs de risques : ce stade nymphal donnera naissance à la dernière génération de papillon.

Méthodes prophylactiques : il n'y a pas de méthode prophylactique efficace.




Chrysalide de pyrale du buis

Suivi piégeage de la Pyrale du Buis en Normandie



8 collectivités du réseau Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures et 11 établissements de la filière Cultures ornementales participent à ce dispositif de piégeage réalisé en partenariat avec le BSV Cultures ornementales. Les pièges ont été installés semaine 15.

		Piégeage de la Pyrale du buis				
		Basse-Normandie			Haute-Normandie	
		Calvados	Manche	Orne	Seine-Maritime	Eure
	BSV Cultures Ornementales	3 établissements	1 établissement	1 établissement	5 établissements	1 établissement
	BSV JEVI	1 collectivité	1 collectivité	2 collectivités	1 collectivité	3 collectivités
Relevé n°1	Semaine 16	0	0	0	0	0
Relevé n°10	Semaine 25	0	0	0	0	0
Relevé n°11	Semaine 26	2	0	0	0	0
Relevé n°12	Semaine 27	3	0	0	0	0
Relevé n°13	Semaine 28	8	0	0	0	0
Relevé n°14	Semaine 29	2	0	0	0	0
Relevé n°15	Semaine 30	6	0	0	0	0
Relevé n°16	Semaine 31	0	0	0	0	0
Relevé n°17	Semaine 32	0	0	0	0	0
Relevé n°18	Semaine 33	0	0	0	0	0
Relevé n°19	Semaine 34	6	0	0	0	0
Relevé n°20	Semaine 35	6	0	0	0	0



Crédit photos : FREDON Basse-Normandie