



Animateur référent
Louis HECK
ARVALIS
02 31 71 21 93
l.heck@arvalis.fr

Animatrices suppléantes
Maëlle LE BRAS
ARVALIS
02 31 71 13 91
m.lebras@arvalis.fr

Animateur suppléant
Quentin GIRARD
ARVALIS
02 32 07 07 54
q.girard@arvalis.fr

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écophyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



Avec le soutien financier de



Bilan de campagne Céréales 2025-2026

21 acteurs régionaux ont participé, merci à eux !

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, les Chambres d'agriculture de Normandie, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici




Vous souhaitez rejoindre le réseau BSV Céréales Normandie ?

Contactez l.heck@arvalis.fr ou
emmanuel.gsell@normandie.chambagri.fr

111 parcelles ont été observées durant cette campagne 2025-2026
(contre 109 l'an passé)

- 72 parcelles de blé tendre
- 39 parcelles d'orge d'hiver



Répartition des parcelles observées : en vert les parcelles de **blé tendre**
d'hiver, en orange les parcelles **d'orge d'hiver**

Bilan climatique et sanitaire globale de la campagne

1- Une plage de semis centrée sur mi-octobre qui a permis une bonne implantation et une levée rapide et homogène

Les implantations de blé et d'orge ont été faites dans de bonnes conditions cette année : temps humide et doux qui a favorisé de bonnes levées à l'échelle de la région. Les désherbages de prélevée ont pu être fait dans le sec et manquer parfois d'efficacité – principalement sur les semis les plus précoces. Ces conditions météorologiques de début de cycle ont notamment été favorables aux pucerons, qu'on a pu observer durant une période assez longue, tandis que l'absence globale de limaces est un fait marquant de l'année. On sort donc de l'hiver avec des parcelles bien implantées qui vont très vite être soumises à des excès d'eau particulièrement préjudiciables pour les cultures d'orge d'hiver – plus sensibles. Les reliquats sortie d'hiver, réalisés avant ces pluies de février, sont historiquement élevés et constituent une bonne base de nutrition pour les cultures.

2- Une montaison chaude au-dessus des médianes 20 ans de chaque mois

Les conditions climatiques ont généré une fois de plus des épi 1cm très précoce parfois début mars avec suffisamment d'alternance d'eau et de sec pour bien valoriser les apports d'azote autour d'épi 1cm. En revanche les apports tallage n'ont pas toujours pu être réalisés car les parcelles – pour certaines ennoyées – n'étaient pas toujours praticables. La montaison en conditions sèches a donc aussi été plus rapide avec une montée à épis moins importante – surtout comparé avec le pluriannuel. Les conditions autour de la floraison ont globalement été très bonnes avec un rayonnement et des températures très élevées qui ont permis une bonne fertilité (suffisante ? insuffisante ? à voir dans la benne !). Du fait de ces conditions la septoriose s'est très peu exprimée. La pression maladie globale a été faible malgré quelques cas de rouille jaune et/ou de rouille brune avec une forte nuisibilité, due en partie aux pratiques : protection ou variété inadaptées. La rouille brune a ainsi pu être très préjudiciable dans certains cas en juin. Les orges ont plus été exposées, quant à elles, au développement de l'helminthosporiose et de la ramulariose en fin de cycle.

3- Des dernières composantes de rendement à évaluer après la récolte

Les récoltes sont déjà bien avancées en blé tendre d'hiver et presque clôturées en orge d'hiver. Les composantes de PMG, PS et protéines seront analysées dans les essais après récolte et feront l'objet d'un webinaire (cf adresse d'inscription ci-dessous) spécifique.

Ce webinaire sera aussi l'occasion de revenir sur les résultats d'essais variétés d'orge d'hiver et de blé tendre d'hiver pour cette récolte 2026.



Jeudi 27 août 2026 de 8h30 à 10h00

Webinaire Bilan de campagne 2026 et préconisations variétales



Je m'inscris

ou j'écris à v.langlois@arvalis.fr ou j.jean@arvalis.fr



Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Tercici


Offre climatique - Caen





Offre climatique - Evreux




La même dynamique est observée sur toutes les stations normandes



Cumul de température 2026 en % de la médiane 20 ans entre le 01/03 et le 01/07



Cumul de pluviométrie 2026 en % de la médiane 20 ans entre le 01/03 et le 01/07



Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici

Bilan sanitaire Blé tendre d'hiver

L'ensemble de ces résultats est à nuancer car le pourcentage d'évolution est calculé sur l'effectif de parcelles observées, effectif pouvant varier selon les semaines.

MALADIES/ RAVAGEURS	NORMANDIE 2023/2024	NORMANDIE 2024/2025	NORMANDIE 2025/2026
Limaces	Faible	Moyenne	Faible
Pucerons d'automne	Faible	Forte	Moyenne
Cicadelles	Faible	Faible	Faible
Oïdium	Moyenne	Moyenne	Faible
Rouille jaune	Faible	Faible	Moyenne
Septoriose	Forte	Faible	Moyenne
Rouille brune	Forte	Forte	Forte
Pucerons des épis	Faible	Moyenne	Faible
Cécidomyïes	Faible	Faible	Faible

Légende

Vert : absence du bioagresseur ou seuil de nuisibilité jamais atteint

Jaune : présence faible, avec seuil de nuisibilité parfois atteint

Rouge : seuil de nuisibilité souvent dépassé

Limaces, pression faible en 2026 sur blé tendre


La pression limace est finalement faible cette année en blé tendre avec des conditions climatiques favorisant leur développement. Ainsi entre la levée et le stade 3 feuilles, 2% des parcelles observées dans le réseau ont présenté des dégâts de limaces supérieurs à 30% (seuil de nuisibilité identifié pour ce ravageur).



Limace noire sur céréales
(Eure)

Source : Charles Baudart

Parcelles de blé ayant des dégâts de limaces > à 30% entre la levée et le stade 3 feuilles (Z10 → Z13)



Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Tercici


Pucerons d'automne, une pression moyenne à l'automne expliquée par une présence longue

La présence de pucerons a été dans les moyennes hautes par rapport aux dernières années. En cause des températures douces du 27 octobre au 22 décembre (la période de gel de novembre ayant été intense mais courte). La période douce quant à elle a duré et les pucerons ont pu avoir une présence plus longue. Cela explique que 10% des parcelles du réseau ont dépassé le seuil de nuisibilité. En revanche à la suite de décembre les températures ne se sont pas radoucies et il n'y a plus eu de pucerons piégé ou observé.

De plus, aucune observation de JNO n'a été relevée dans le réseau BSV.

Rappel : seuil de nuisibilité
= 10% de plantes
porteuses, ou pucerons
présents plus de 10 jours
dans la parcelle

Parcelles de *Blé* avec plus de 10% de plantes porteuses de pucerons entre la levée et le stade Epi 1 cm (Z10 → Z30)



Cicadelles vectrices de viroses :


Parmi les 35 observations de cicadelles réalisées cet automne sur 35 parcelles, 48% font état de présence de cicadelles, mais toutes sont en dessous du seuil de nuisibilité fixé à 30 captures par semaine. Aucun symptôme des pieds chétifs n'a été recensé dans le réseau en sortie d'hiver.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici

Oïdium :


La présence d'oïdium est restée globalement faible cette année, sauf peut-être en début de cycle. Les conditions favorables de la maladie sont : variétés sensibles, fertilisation précoce, densité culture importante, longue période sans pluie. Dans beaucoup de cas la fertilisation précoce n'a pas toujours eu lieu, les densités de culture ont pu être impactées à la baisse par le sec courant montaison.



Une rouille jaune bien présente en début de cycle et contrôlée par la suite

2026 a été marqué par une pression importante en début de cycle qui a cependant été contenue en partie par les résistances variétales et les conditions météorologiques.

Pour rappel, 2 nouvelles races de rouille jaune risquent de se développer en France cette année : la race Chevignon et la race Champion. Des échantillons ont pu être prélevés pour analyses afin d'identifier plus finement ces contournements de résistance.




Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terci


Une pression rouille brune très importante depuis 3 ans surtout en de fin cycle

La présence de rouille brune cette année a été très importante en fin de cycle mais aussi en début de cycle, comparé à la pression des autres années sur la même période. Sa nuisibilité n'est pas moindre et commence à être de plus en plus préjudiciable. Les variétés de la région sont souvent peu choisies vis-à-vis de cette maladie qui prend pourtant de plus en plus de place.



Un inoculum septoriose important mis en défaut par le climat :

L'inoculum pour cette campagne était probablement important et les sols humides à la suite des pluies de février. La montaison particulièrement peu arrosée n'a pas permis de faire progresser la septoriose et l'a souvent cantonnée aux feuilles les plus basses du blé tendre. Le panel des variétés résistantes à la septoriose (note CTPS >7) s'est étoffé ces dernières années, et cela a permis de lutter efficacement contre le développement de la maladie.



Ravageurs de printemps

Parmi les 38 parcelles suivies cette année, 15 ont fait état de la présence de pucerons mais le seuil de nuisibilité (=50% des épis touchés dans une parcelle) n'a jamais été dépassé.

Parmi les 17 parcelles suivies pour les **cécidomyies orange** cette année, 3 ont fait état de présence de ce ravageur et aucune n'a atteint le seuil de nuisibilité (=10 captures par jour).

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici

Bilan sanitaire Orge d'hiver

L'ensemble de ces résultats est à nuancer car le pourcentage d'évolution est calculé sur l'effectif de parcelles observées, effectif pouvant varier selon les semaines.

MALADIES / RAVAGEURS	NORMANDIE 2023/2024	NORMANDIE 2024/2025	NORMANDIE 2025/2026
Limaces	Moyenne	Moyenne	Faible
Pucerons	Faible	Forte	Moyenne
Rouille naine	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Oïdium	Moyenne	Forte	Faible
Rhynchosporiose	Moyenne	Faible	Faible
Helminthosporiose	Forte	Faible	Forte
Ramulariose	Forte	Faible	Moyenne

Légende

Vert : absence du bioagresseur ou seuil de nuisibilité jamais atteint


Jaune : présence faible, avec seuil de nuisibilité parfois atteint

Rouge : seuil de nuisibilité souvent dépassé

Limaces en orge d'hiver, une pression faible cette année

Tout comme pour le blé tendre, les parcelles d'orge suivies dans le réseau ont recensé une pression limaces très faible, puisqu'aucune parcelle n'a atteint le seuil de nuisibilité.

Parcelles d'orge ayant des dégâts de limaces > à 30% entre la levée et le stade 3 feuilles (Z10 → Z13)




Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici

Pucerons d'automne :


La présence de pucerons d'automne sur orge a encore été importante cette année mais bien inférieure à l'année dernière. Cette année 20% des parcelles d'orge ont dépassé le seuil de risque, fixé à plus de 10% de plantes porteuses de pucerons. On sait que l'orge est plus appétente pour les pucerons que le blé mais le choix variétal en orge permet d'avoir de meilleures résistances. Aucun symptôme de JNO n'a été remonté dans le réseau BSV – le choix variétal là encore peut expliquer cette absence de symptômes.

Parcelles d'orge avec plus de 10% de plantes porteuses de pucerons entre la levée et le stade Epi 1 cm (Z10 → Z30)



Rouille naine :

La campagne 2026 pour la rouille naine peut s'apparenter à celle de 2024 avec une pression importante en début de cycle qui diminue avec notamment l'arrivée des températures élevées (19 avril).




Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici


Oïdium :

La pression oïdium a été très faible tout au long du cycle en 2026 car les facteurs de risque n'étaient, pour la plupart, pas réunis au bon moment : Fertilisation précoce, densité culture importante et surtout longue période sans pluie.



Rhynchosporiose :

La pression rhynchosporiose est restée faible et stable cette année en Normandie – tout comme en 2025. La pression a été ralentie par les fortes T°C. L'un des leviers efficace reste la tolérance variétale.




Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici

Helminthosporiose :

L'Helminthosporiose s'est développée de manière très précoce et de façon constante pour la première fois depuis au moins 5 ans, et ce, dans toute la région. Des variétés peu adaptées et beaucoup de résidus de paille laissés en surface sont des facteurs favorisant l'expression de la maladie. La température de fructification de la maladie se fait à partir de 15°C, ce qui était largement le cas assez tôt en campagne – à savoir aussi que sa durée d'incubation est très courte et la maladie peut se développer rapidement. Son cycle de développement est rapide.



Ramulariose :

La ramulariose a été très peu observée cette année dans le réseau BSV (6 parcelles d'observations) mais plusieurs retours attestent de sa présence pour cette campagne. Elle a été trouvée sur toutes les parcelles où elle a été observée.

Consulter les notes nationales Biodiversité :

(Rendez-vous sur la page EcophytoPIC : <https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>)



Méthodes alternatives : des produits de biocontrôle existent

[Note DGAL du 22/06/2023 qui établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.](#)

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Agrial, AgroSolEvolution, Arvalis, Axone, CA14, CA27, CA50, CA61, CA76, la Coopérative de Bellême, la Coopérative de Creully, D2N, Dumesnil SAS, Fredon Normandie, Lycée agricole de Chambray, Lepicard Agriculture, Lycée agricole du Robillard, SCEA du Val Doré, Sevepi, Soufflet Agriculture et Terdici