



Animateur référent

Alexandre METAIS
ITB
02 35 12 26 72
a.métais@itbfr.org

Animateur suppléant

Nicolas MAILLARD
ITB
02 35 12 26 72
n.maillard@itbfr.org

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président de la Chambre
d'agriculture de région
Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

Abonnez-vous sur

normandie.chambres-agriculture.fr

Action du plan Écophyto pilotée
par les Ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de
la santé et de la recherche avec
l'appui technique et financier de
l'Office Français de la Biodiversité



Avec le soutien financier de



A retenir


- ✓ **Pucerons** : premiers pucerons observés sur moins de 10 % des parcelles. Aucune parcelle n'a atteint le seuil de risque
- ✓ **Parasitisme souterrain** : faible activité. Aucun dégât signalé.
- ✓ **Altise** : faible activité, très peu de symptômes observés.

Le réseau d'observation

Cette semaine, les observations ont été réalisées sur 30 parcelles fixes.

Stades

Stades des betteraves



Le stade des betteraves varie de cotylédons étalés à 4 feuilles naissantes pour les plus avancées.

Pucerons

Observations :

Eure (12 parcelles fixes) : 1 parcelle présente des pucerons verts aptères avec une fréquence de betteraves atteintes de 4 %. 1 parcelle présente des pucerons noirs aptères avec une fréquence de betteraves atteintes de 4 %.

Seine-Maritime (18 parcelles fixes) : 1 parcelle présente des pucerons verts aptères avec une fréquence de betteraves atteintes de 4 %.

Seuil indicatif de risque : 10% des betteraves colonisées par au moins 1 aptère vert.

Analyse de risque :

Les premiers vols de pucerons sont observés sur la région en très faible quantité. **La présence de pucerons verts aptères est constatée sur moins de 10 % des parcelles du réseau. Sur ces parcelles, la fréquence de plantes avec présence de pucerons est très faible. Aucune parcelle n'a atteint le seuil de risque.**




**Puceron vert aptère
Myzus persicae**

Méthodes de luttes alternatives préventives :

- Détruire les repousses de betteraves sur cordons de déterrage et silos de betteraves fourragères.
- Détruire les éventuelles repousses dans les céréales implantées avant betteraves

Cartographie des observations du 14 avril (retrouvez cette carte mise à jour régulièrement dans l'OAD

« Alerte pucerons » disponible sur le site internet de l'ITB <https://www.itbfr.org/>)



Statut des parcelles :

T0 seuil de risque pucerons non atteint

Altises

Observations : La présence de dégâts d'altises est observée sur 1 parcelle, avec une fréquence de plantes touchées de 10 %.

Symptômes : les dégâts d'altises se caractérisent par des petites perforations irrégulières sur les cotylédons et premières feuilles.

Seuil indicatif de risque : 30 % des feuilles avec de nombreuses piqures.

Analyse de risque :

La présence de dégâts d'altise est marginale sur la région. Risque très faible à ce jour.



Perforations d'altises

Notes nationales Biodiversité

