



Colza

Normandie

BSV n°04-26 le 04 mars 2026 (Semaine 10)

Parcelles BSV observées du 2026-02-25 au 2026-03-04

L'essentiel de la semaine


55 parcelles observées pour ce BSV.

Stades : D1 à E. D2 majoritaire.

Charançons de la tige du colza : captures fréquentes depuis 7 jours. Risque élevé dans 2/3 des parcelles.

Méligèthes : présence généralisée depuis 5-7 jours. Pression hétérogène, parfois très élevée. A examiner de près à l'échelle de la parcelle.

Larves d'altises : niveau de pression élevé voire très élevé cette année. C'est un élément de contexte important à intégrer dans les conduites à tenir dans les prochaines semaines.




Prévisions météo

JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09	MARDI 10	MERCREDI 11
6° / 18°	8° / 18°	8° / 18°	8° / 19°	8° / 16°	7° / 13°	6° / 15°
► 20 km/h	► 10 km/h	► 15 km/h	► 15 km/h	◄ 15 km/h	▲ 20 km/h	◄ 20 km/h
						45 km/h

(Source : Météo France, Caen, 04/03/26 à 10h00. Retrouvez les données actualisées [ici](#)).

Montaison active



Stade D2 majoritaire cette semaine.

Le rythme de développement est soutenu, comme en 2024.

Dans un contexte de températures très douces, les stades sont en avance, environ 10 jours par rapport la normale des 15 dernières années.

Les premières fleurs s'observent par ci par là (variétés précoces « piège à méligèthes » ou repousses de colza...)



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
05.46.07.38.29
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écophyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Avec le soutien financier de



Charançons de la tige du colza : risque avéré depuis une semaine




Observations cuvettes jaunes

Charançons de la tige du colza : 32 pièges jaunes sur 51 sont positifs (de 1 à 30 individus capturés).

Captures du 25/02/2026 au
03/03/2026

Captures du 18/02/2026 au
24/02/2026

Captures du 05/02/2026 au
17/02/2026



Légende : ● aucune capture ; ● 1 capture ; ● 2 à 5 captures ; ● > 5 captures

Charançons de la tige du chou (non nuisible) : 54 % des cuvettes ont enregistré des captures de charançons de la tige du chou (de 1 à 158 individus).

Modélisation du risque de captures



L'outil mis à disposition par Terres Inovia maintient une probabilité toujours élevée de piégeages pour les prochains jours.

[Cliquer](#) pour connaître l'évolution du risque journalier (jusqu'à J+7) dans votre commune ou pour visualiser le risque sur l'ensemble du territoire pour une date donnée

Gestion du risque

Période de risque vis-à-vis du charançon de la tige du colza : présence de femelles aptes à pondre, généralement dans les 8 jours après enregistrement des premières captures ET présence de colza aux tiges principales tendres (stade C2 jusqu'au stade E).

Seuil indicatif de risque : La seule présence de l'insecte est considérée comme un risque. Ce sont les pontes des femelles qui sont par la suite préjudiciables à la culture. Les dépôts d'œufs provoquent une désorganisation des tissus qui composent la tige (jusqu'à son éclatement dans le sens de la longueur). La nuisibilité est conditionnée par l'état du colza et la dynamique de croissance des tiges.

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne croissance en biomasse et d'un système racinaire optimal.

Analyse de risque vis-à-vis du charançon de la tige du colza

Les conditions météo depuis le 24/25 février ont déclenché depuis plusieurs jours un **vol significatif dans près de 2/3 des parcelles du réseau** (Eure, Orne, Calvados, Pays de Bray).

En Normandie, les secteurs de Pays de Caux, le littoral de la pointe de Caux jusque dans le Bessin et le Centre et Nord Manche sont traditionnellement moins concernés par ce ravageur. La carte ci-dessus traduit assez bien les zones de piégeages habituels. Attention, les températures anormales peuvent bousculer ces « habitudes ». Le réseau BSV manque aujourd'hui de points de captures dans certains secteurs.

Le risque doit être pris en compte sans tarder pour les parcelles situées dans les zones où le réseau de cuvettes a signalé sa présence ces derniers jours.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :





AGRIAL, AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, AXONE, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, COOP DE BELLEME, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, LEPICARD AGRICULTURE, SOUFFLET AGRICULTURE, TERDICI APPRO, TERRES INOVIA

Meligèthes : arrivées précoces ... parfois très abondantes

Observations

% de plantes porteuses de méligèthes : 40 parcelles sur 44 observées ont signalé la présence de méligèthes sur plante cette semaine. Dans ces parcelles, 1 à 100 % de plantes sont colonisées (moy = 64 %).

Nombre de méligèthes par plante : Pour les 47 parcelles colonisées observées, le nombre moyen d'individus fluctue de 0.7 à 30 par plante (moy = 5.8) cette semaine.



% de plantes avec présence de méligèthes :

● absence ● 1 à 50 % ● 51 à 80 % ● 81 à 100 %

Nombre moyen de méligèthes par plante

● 0 ●]0 et 3] ●]3 et 6] ● > 6

Le tableau ci-dessous résume les niveaux d'infestation mesurés selon les stades cette semaine :

Stade du colza (stade 50)	Nb de parcelles observées cette semaine	Parcelles avec présence de méligèthes				Nb de parcelles ayant dépassé le seuil	
		Nombre de parcelles avec méligèthes	Moyenne de méligèthes /plante	Min. de méligèthes /plante	Max. de méligèthes /plante	Seuil Colza handicapé	Seuil Colza sain
D1	8	6	10.3	1	30	6/8	4/8
D2	28	25	4.5	1	18	25/28	12/28
E sans fleurs	11	11	6.2	0.6	17	9/11	5/11
E avec fleurs	-	-	-	-	-	-	-
Total	47	42	5.8	0.6	30	40/47	21/47

Période de risque vis-à-vis du méligèthe

Du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée (F1).

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne croissance en biomasse et d'un système racinaire optimal. Mélange variétal avec variété précoce type DK Exavance ou Lid Treto ou Attrakt...



Le couple « méligèthe / pyrèthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance



Seuils indicatifs de risque

Etat de la culture	Seuil indicatif de risque en fonction du stade de la culture	
	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza handicapé , peu vigoureux, conditions environnementales peu favorables aux compensations *	1 méligèthe/plante	2-3 méligèthes/plante
Colza sain et vigoureux , bien implanté, dans un sol profond et en l'absence de stress printanier significatif	3 méligèthes par plante	6-9 méligèthes/plante

*températures faibles, asphyxies racinaires, impact notable du gel, risque stress hydriques à floraison, dégâts parasitaires antérieurs, sols superficiels, etc.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRIAL, AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, AXONE, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, COOP DE BELLEME, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, LEPICARD AGRICULTURE, SOUFFLET AGRICULTURE, TERDICI APPRO, TERRES INOVIA

Analyse de risque vis-à-vis du méligèthe

100 % des parcelles sont dans la phase sensible.

Le risque global peut être considéré comme **élevé**.

Une vigilance très régulière (2 à 3 fois par semaine) est recommandée. Les conditions climatiques récentes, actuelles et des prochains jours sont très favorables aux migrations et à l'activité des insectes sur plantes.

Dans de nombreuses parcelles, les arrivées ont même pu être très spectaculaires.

Toutefois, il y a de grosses différences selon les parcelles.

Le risque vis-à-vis des méligèthes peut être pris en compte conjointement avec celui du charançon de la tige du colza dans de nombreuses situations.

Infestations et dégâts larves d'altises

Observations (tests Berlese)

En sortie hiver, 35 tests Berlese réalisés ont mis en évidence de 1 à 29 larves par plante (moy = 8,4 larves par plante contre 2.7 en 2025, 6.5 en 2024, 6.5 larves en 2023, 3.5 en 2022) à la même époque.

Comme nous le savons, l'infestation est élevée voire très élevée.



Observations dégâts, plantes chétives ou buissonnantes

Sur 32 parcelles diagnostiquées, 6 présentent des premiers signes de dégâts significatifs, 9 des dégâts modérés et 17 restent pour l'instant indemnes.

Les choses sont en train d'évoluer fortement en ce moment, les 10-15 prochains jours nous permettront de juger de l'état plus global de la situation.



Prochain BSV le 11 mars 2026

-----Notes Nationales Biodiversité-----

--

Cliquer sur les images



Produits de Biocontrôle : [infos](#)



Résistances aux pesticides : [infos](#)

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRIAL, AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, CA 14, CA 27, CA 50, CA61, CA 76, D2N, LEPICARD AGRICULTURE, LYCEE DU ROBILLARD, SOUFFLET AGRICULTURE, TERDICI APPRO, TERRES INOVIA

Annexe – Reconnaissance des stades du colza

Stade D1

Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales



Stade D2

Inflorescence principale dégagée, inflorescences secondaires visibles



Stade E

Boutons séparés, les pédoncules s'allongent



Stade F1

Premières fleurs ouvertes sur 50 % des plantes



Photos Terres Inovia
