



Colza

Normandie

BSV n°05-26 le 11 mars 2026 (Semaine 11)

Parcelles BSV observées du 2026-03-04 au 2026-03-10

L'essentiel de la semaine


53 parcelles observées pour ce BSV.

Stades : D2 à F1. E majoritaire.

Charançons de la tige du colza : captures fréquentes depuis 12-13 jours. Risque élevé dans 2/3 des parcelles.

Meligèthes : présence généralisée désormais. Hétérogène mais parfois très élevée. A examiner de près à l'échelle de la parcelle.

Cylindrosporiose : pression typique pour la région, pas d'alerte majeure




Prévisions météo

JEUDI 12	VENDREDI 13	SAMEDI 14	DIMANCHE 15	LUNDI 16	MARDI 17	MERCREDI 18
3° / 14°	6° / 12°	1° / 11°	2° / 12°	5° / 12°	2° / 13°	4° / 17°
▲ 30 km/h	▼ 30 km/h	▲ 20 km/h	▼ 20 km/h	▲ 20 km/h	▲ 15 km/h	▼ 15 km/h
55 km/h	60 km/h		45 km/h	45 km/h		

(Source : Météo France, Sées, 11/03/26 à 10h30. Retrouvez les données actualisées [ici](#)).

Le temps perturbé (pluies, vent) jusqu'à la fin de semaine s'accompagnera d'une chute de températures, plus proches des normales de saison. Ceci devrait freiner sensiblement le rythme de développement et l'avidité des méligèthes.

Premières fleurs présentes, déjà, dans 10-15 % des parcelles !



Stade E majoritaire cette semaine.

Sans doute proche d'un record en terme d'avance de stades.

Des écarts importants de précocité entre parcelles devraient se dessiner dans les prochains jours.

Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
05.46.07.38.29
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écopyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie écopyto

GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

**CHAMBRES
D'AGRICULTURE
NORMANDE**

Avec le soutien financier de

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Charançons de la tige du colza : risque avéré depuis 2 semaines




Observations cuvettes jaunes

Charançons de la tige du colza : 27 pièges jaunes sur 44 sont positifs (de 1 à 30 individus capturés, moy = 5). Les piégeages se poursuivent donc depuis la semaine dernière, à un niveau constant.

Captures du 04/03/2026 au 10/03/2026

Captures du 25/02/2026 au 03/03/2026

Captures du 18/02/2026 au 24/02/2026



Légende : ● aucune capture ; ● 1 capture ; ● 2 à 5 captures ; ● > 5 captures

Charançons de la tige du chou (non nuisible) : 59 % des cuvettes ont enregistré des captures de charançons de la tige du chou (de 1 à 40 individus, moy = 11).

Modélisation du risque de captures

L'outil prédit une baisse de la probabilité de piégeages à compter de vendredi.

[Cliquer](#) pour connaître l'évolution du risque journalier (jusqu'à J+7) dans votre commune ou pour visualiser le risque sur l'ensemble du territoire pour une date donnée



Gestion du risque

Période de risque vis-à-vis du charançon de la tige du colza : présence de femelles aptes à pondre, généralement dans les 8 jours après enregistrement des premières captures ET présence de colza aux tiges principales tendres (stade C2 jusqu'au stade E).

Seuil indicatif de risque : La seule présence de l'insecte est considérée comme un risque. Ce sont les pontes des femelles qui sont par la suite préjudiciables à la culture. Les dépôts d'œufs provoquent une désorganisation des tissus qui composent la tige (jusqu'à son éclatement dans le sens de la longueur). La nuisibilité est conditionnée par l'état du colza et la dynamique de croissance des tiges.

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne croissance en biomasse et d'un système racinaire optimal.

Analyse de risque vis-à-vis du charançon de la tige du colza

Les conditions météo depuis le 24/25 février ont déclenché un et même plusieurs **vols significatifs dans près de 2/3 des parcelles du réseau**.

Les cartes ci-dessus traduisent assez bien les zones de piégeages habituels. Les températures anormales ont quelque peu bousculé ces « habitudes », avec des secteurs qui ont pu piéger dernièrement (Bessin par exemple).

Le risque principal a dû être pris en compte la semaine dernière dans les secteurs où les piégeages étaient déjà significatifs.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :





AGRICOACH, AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, AXONE, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, SOUFFLET AGRICULTURE, TERDICI VÉGÉTALE, TERRES INOVIA

Méligèthes : infestations précoces et rarement aussi élevées !

Observations

% de plantes porteuses de méligèthes :
100 % des parcelles observées sont porteuses du ravageur cette semaine. 10 à 100 % de plantes sont alors colonisées (moy = 74 % contre 64 % la semaine dernière).

Nombre de méligèthes par plante : Pour les 53 parcelles colonisées (sur 53 observées), le nombre moyen d'individus dénombré fluctue de 1 à 23 méligèthes par plante (moy = 7.1, contre 5.8 semaine dernière).



% de plantes avec présence de méligèthes :

● absence ● 1 à 50 % ● 51 à 80 % ● 81 à 100 %

Nombre moyen de méligèthes par plante

● 0 ●]0 et 3] ●]3 et 6] ● > 6

Le tableau ci-dessous résume les niveaux d'infestation mesurés selon les stades cette semaine :

Stade du colza (stade 50)	Nb de parcelles observées cette semaine	Parcelles avec présence de méligèthes				Nb de parcelles ayant dépassé le :	
		Nombre de parcelles avec méligèthes	Moyenne de méligèthes /plante	Min. de méligèthes /plante	Max. de méligèthes /plante	Seuil Colza handicapé	Seuil Colza sain
D2	11	11	6.6	2	23	6/11	4/11
E sans fleurs	34	34	7.8	1	20	27/34	17/34
E avec fleurs	3	3	9.0	2	15	2/3	2/3
F1	5	5	2.8	1	5	-	-
Total	53	53	7.1	1	23	35/53	23/53

Période de risque vis-à-vis du méligèthe

Du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée (F1).

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne croissance en biomasse et d'un système racinaire optimal. Mélange variétal avec variété précoce type DK Exavance ou Lid Treto ou Atrakt...



Le couple « méligèthe / pyrèthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance

Seuils indicatifs de risque

Etat de la culture	Seuil indicatif de risque en fonction du stade de la culture	
	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza handicapé , peu vigoureux, conditions environnementales peu favorables aux compensations *	1 méligèthe/plante	2-3 méligèthes/plante
Colza sain et vigoureux , bien implanté, dans un sol profond et en l'absence de stress printanier significatif	3 méligèthes par plante	6-9 méligèthes/plante

*températures faibles, asphyxies racinaires, impact notable du gel, risque stress hydriques à floraison, dégâts parasites antérieurs, sols superficiels, etc.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRICOACH, AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, AXONE, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, SOUFFLET AGRICULTURE, TERDICI VÉGÉTALE, TERRES INOVIA

Analyse de risque vis-à-vis du méligèthe

100 % des parcelles sont dans la phase sensible.

Le risque global est **élevé**, le plus élevé depuis 2021. Jamais nous n'avions vu des arrivées généralisées aussi précoces. La pression reste hétérogène malgré tout.

Dans de nombreuses parcelles, les niveaux d'infestations sont largement au-dessus des seuils. Le risque vis-à-vis des méligèthes a été pris en compte conjointement avec celui du charançon de la tige du colza dans de nombreuses situations.

Désormais, c'est bien la menace méligèthe qui prend le dessus et demeure l'actualité du moment. Il est probable que la gestion curative doive être réitérée dans les situations le plus à risque (parcelles entourées de bois, haies, secteurs de vallées en particulier), tant que la floraison n'est pas lancée.

La perturbation et la baisse des températures que nous vivrons ces quelques prochains jours, la vigilance doit donc se maintenir (2 à 3 fois par semaine).

Les premières parcelles au stade F1, si elles sont saines, sortiront rapidement de la période sensible.

Dégâts de larves d'altises

Observations dégâts, plantes chétives ou buissonnantes

Sur 35 parcelles diagnostiquées, 19 présentent des signes de dégâts dont :

- 9 parcelles avec des dégâts faibles quasi insignifiants,
- 6 parcelles avec des dégâts modérés jusqu'à 20 % de plantes chétives ou buissonnantes ;
- 4 parcelles plus sévèrement touchées, avec plus de 20 % de plantes affectées).



Cylindrosporiose : présence habituelle, variable selon les parcelles

Observations et analyse de risque

20 parcelles sur 44 observées depuis 15 jours montrent des symptômes sur 5 à 20 % de plantes.

Evaluation du risque : aucun seuil de risque retenu. Le risque est généralement pris en compte en même temps que le risque sclerotinia (stade G1).

Surveiller l'évolution des taches au gré de la croissance du colza. Les pluies de ces jours-ci seront propices à l'apparition de symptômes dans la région.

NB : les symptômes sur feuilles ne présagent pas systématiquement des dégâts à l'arrivée. Certaines variétés peuvent marquer sur feuilles mais sans grand risque ultérieur (ex KWS PIANOS, FELICIANO KWS, RGT PARADIZZE, KWS DINGOS, BESSITO...).

Les variétés assez sensibles à surveiller sont par exemple : BLACKJACK, LID CRATEO, CROSSFIT, HEMOTION, KWS DEMOS, KWS MIKADOS, LID INVICTO, LID TEBO.



Prophylaxie / mesures préventives : broyage et enfouissement des pailles de colza N-1 touché par la maladie, choix de variétés peu sensibles à très peu sensibles à la cylindrosporiose

Prochain BSV le 18 mars 2026

-----Notes Nationales Biodiversité-----

Cliquer sur les images



Produits de Biocontrôle : [infos](#)



Résistances aux pesticides : [infos](#)

Annexe – Reconnaissance des stades du colza

Stade D2

Inflorescence principale
dégagée, inflorescences
secondaires visibles



Stade E

Boutons séparés, les
pédoncles s'allongent



Stade F1

Premières fleurs ouvertes
sur au moins 50 % des
plantes



Stade F2

Premières fleurs ouvertes
sur 50 % des plantes



Photos Terres Inovia