



Colza

Normandie

BSV n°06-26 le 18 mars 2026 (Semaine 12)

L'essentiel de la semaine

48 parcelles observées pour ce BSV.


Stades : E à F1 majoritaire.

Charançons de la tige : captures en nette diminution. Fin du risque.

Meligèthes : présence un peu plus faible mais risque élevé maintenu pour les parcelles présentant peu ou pas de fleurs.

Cylindrosporiose : pression typique pour la région, pas d'alerte majeure.

Parcelles BSV observées du 2026-03-11 au 2026-03-18




Prévisions météo

JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23	MARDI 24	MERCREDI 25
2° / 19°	0° / 19°	2° / 15°	2° / 16°	2° / 14°	4° / 9°	2° / 8°
◀ 15 km/h	◀ 15 km/h	▶ 15 km/h	▶ 15 km/h	▶ 20 km/h 50 km/h	▶ 20 km/h 55 km/h	▶ 20 km/h 50 km/h

(Source : Météo France, Lisieux, 18/03/26 à 09. Retrouvez les données actualisées [ici](#)).

Après un refroidissement jusqu'au début de semaine, le temps redevient printanier, avec des petites gelées matinales par endroits et une amplitude thermique notable en lien avec le retour du soleil et la présence d'un ciel dégagé.

40 à 50 % des parcelles au stade F1



Les fleurs sont visibles dans 3/4 des parcelles visitées ce début de semaine.

Pour autant, le stade E reste majoritaire

L'année reste « précoce » avec en toile de fond un nombre non négligeable de parcelles « poussives » en ce début de floraison : larves d'altises, meligèthes et faibles dynamiques de

croissance automnale et de sortie hiver en sont alors les principales causes.

A noter : toute parcelle ayant atteint le stade F1 vers le 15 mars devrait être au stade G1 vers le 25 mars, d'après les températures annoncées.



Animateur référent
Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante
Solana VERA
TERRES INOVIA
05.46.07.38.29
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écophyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Avec le soutien financier de




Charançons de la tige du colza : fin du risque

Observations cuvettes jaunes


Charançons de la tige du colza : 2 pièges jaunes sur 11 sont positifs (1 individu capturé). C'est la dernière semaine de relevés de pièges.
Charançons de la tige du chou (non nuisible) : Aucune capture cette semaine.




Captures du
11/03/2026 au
18/03/2026




Captures du
04/03/2026 au
10/03/2026



Captures du
25/02/2026 au
03/03/2026



Captures du
18/02/2026 au
24/02/2026



Légende : ● aucune capture ; ● 1 capture ; ● 2 à 5 captures ; ● > 5 captures

Modélisation du risque de captures

L'outil confirme bien ce qu'indique le réseau de piégeage.

[Cliquer](#) pour connaître l'évolution du risque journalier (jusqu'à J+7) dans votre commune ou pour visualiser le risque sur l'ensemble du territoire pour une date donnée



Analyse de risque vis-à-vis du charançon de la tige du colza

Les captures ont chuté en même temps que le retour du temps frais et maussade la semaine dernière. Le risque de nouvelles piqûres compromettantes peut désormais être considéré comme nul, pour toutes les parcelles ayant largement atteint le stade E.


Le risque principal a dû être pris en compte il y a 10 à 15 jours dans les secteurs où les piégeages étaient déjà significatifs.

Meligèthes : infestations stables voire en légère diminution - vigilance toujours dans les situations à risque


Observations

Nombre de méligèthes par plante : Pour les 38 parcelles colonisées (sur 39 observées cette semaine), le nombre moyen d'individus dénombré fluctue de 1 à 23 méligèthes par plante (moy = 4.2 contre 7.1 et contre 5.8 semaine dernière).


Du 11/03/2026 au
17/03/2026




Du 04/03/2026 au
10/03/2026



Du 25/02/2026 au
03/03/2026



Du 18/02/2026 au
24/02/2026



Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRIAL, AGRICOACH, AGRICULTEUR, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, SOUFFLET AGRICULTURE

Nombre moyen de méligèthes par plante : ● 0 ●]0 et 3] ●]3 et 6] ● > 6

Le tableau ci-dessous résume les niveaux d'infestation mesurés selon les stades cette semaine :

Stade du colza (stade 50)	Nb de parcelles observées cette semaine	Parcelles avec présence de méligèthes				Nb de parcelles ayant dépassé le :	
		Nombre de parcelles avec méligèthes	Moyenne de méligèthes /plante	Min. de méligèthes /plante	Max. de méligèthes /plante	Seuil Colza handicapé	Seuil Colza sain
D2	1	1	5	5	5	1/1	1/1
E sans fleurs	9	8	3.5	1	5	6/9	0/9
E avec fleurs	19	19	4.8	1	15	15/19	3/19
F1	10	10	3.5	0.9	10	-	-
Total	39	38	4.2	0.9	15	22/39	4/39

Période de risque vis-à-vis du méligèthe

Du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée (F1).

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne croissance en biomasse et d'un système racinaire optimal. Mélange variétal avec variété précoce type DK Exavance ou Lid Treto ou Atrakt...



Résistance avérée pour le couple « méligèthe / pyrèthrinoïdes »



Seuils indicatifs de risque

Etat de la culture	Seuil indicatif de risque en fonction du stade de la culture	
	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza handicapé , peu vigoureux, conditions environnementales peu favorables aux compensations *	1 méligèthe/plante	2-3 méligèthes/plante
Colza sain et vigoureux , bien implanté, dans un sol profond et en l'absence de stress printanier significatif	3 méligèthes par plante	6-9 méligèthes/plante

*températures faibles, asphyxies racinaires, impact notable du gel, risque stress hydriques à floraison, dégâts parasites antérieurs, sols superficiels, etc.

Analyse de risque vis-à-vis du méligèthe

- 25 % des parcelles sont au stade F1 voire plus (le risque méligèthe est théoriquement écarté dans ces cas) mais 75 % restent encore sous la menace, même si des fleurs y sont apparues.
- On constate un nombre significatif de parcelles affaiblies (larves d'altises..) dont le rythme de mise à fleurs est d'ores-et-déjà largement ralenti ;
- Les niveaux d'infestations sont en tendance en diminution (mais pas partout) en lien avec les conditions plus défavorables ces derniers jours et les stades qui s'enchainent.
- Le risque global vis-à-vis des méligèthes reste **élevé** dans les parcelles qui n'ont pas enclenché un début de floraison « tonique » (au moins 50 % de plantes avec fleurs). Et les conditions météo annoncées peuvent faire revenir d'autres méligèthes...
- Les dégâts sont visibles dans les situations non maîtrisées précocement, en particulier dans les secteurs entourés de bois, les vallées ou secteurs avec présence importante de colza dans le paysage. La floraison « patine ».
- Un renouvellement de la gestion curative pourrait être nécessaire dans les situations le plus à risque (parcelles entourées de bois, haies, secteurs de vallées en particulier).



Dégâts de larves d'altises

Observations dégâts, plantes chétives ou buissonnantes

Sur 43 parcelles diagnostiquées, 29 présentent des signes de dégâts (soit 67 %) dont :

- 13 parcelles (30%) avec des dégâts faibles quasi insignifiants,
- 8 parcelles (18%) avec des dégâts modérés jusqu'à 20 % de plantes chétives ou buissonnantes ;
- 8 parcelles plus sévèrement touchées, avec plus de 20 % de plantes affectées).



Cylindrosporiose : présence habituelle, variable selon les parcelles

Observations et analyse de risque

20 parcelles sur 44 observées depuis début mars montrent des symptômes sur 1 à 80 % de plantes.

Evaluation du risque : aucun seuil de risque retenu. Le risque est généralement pris en compte en même temps que le risque sclerotinia (stade G1).

Surveiller l'évolution des taches au gré de la croissance du colza. Les pluies de ces jours-ci seront propices à l'apparition de symptômes dans la région.

NB : les symptômes sur feuilles ne présagent pas systématiquement des dégâts à l'arrivée. Certaines variétés peuvent marquer sur feuilles mais sans grand risque ultérieur (ex KWS PIANOS, FELICIANO KWS, RGT PARADIZZE, KWS DINGOS, BESSITO...).

Les variétés assez sensibles à surveiller sont par exemple : BLACKJACK, LID CRATEO, CROSSFIT, HEMOTION, KWS DEMOS, KWS MIKADOS, LID INVICTO, LID TEBO.



Prophylaxie / mesures préventives : broyage et enfouissement des pailles de colza N-1 touché par la maladie, choix de variétés peu sensibles à très peu sensibles à la cylindrosporiose

Mycosphaerella : rares signalements

Observations

5 parcelles sur 38 observées depuis deux semaines font état de présence (faible) de taches de mycosphaerella sur feuilles basses (âgées). Cette maladie foliaire est très peu répandue dans la région en temps normal.



Evaluation du risque : à ce jour, pas de seuil de risque pour cette maladie.

Le risque sera pris en compte en même temps que le risque sclerotinia (stade G1).

Prochain BSV le 25 mars 2026

-----Notes Nationales Biodiversité-----

Cliquer sur les images



Produits de Biocontrôle : [infos](#)



Résistances aux pesticides : [infos](#)

-----Annexe – Reconnaissance des stades du colza-----

Stade E

Boutons séparés, les pédoncules s'allongent



Stade F1

Premières fleurs ouvertes sur au moins 50 % des plantes



Stade F2

Hampe principale fleurie sur les 2/3 de sa longueur



Stade G1

Les 10 premières siliques de la hampe principale ont une longueur < à 2 cm.
Chute des 1^{ers} pétales.

