



Colza



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
07 61 82 30 33
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des
Chambres d'agriculture de Normandie et des
partenaires.

À consulter sur : normandie.chambres-agriculture.fr




BSV n°15-26 le 09 septembre 2026 (Semaine 37)

L'essentiel de la semaine

- Réseau colza en cours de mise en place.
- 36 parcelles déclarées à ce jour.
- Installer les cuvettes jaunes dès que possible.
- Colzas majoritairement au stade cotylédon-une feuille. Premières parcelles au stade B3-B4.
- Premières captures de petites et grosses altises. Quelques morsures aussi, sans gravité à ce jour. La surveillance régulière débute désormais.

Parcelles BSV observées du 2026-09-02 au 2026-09-08



Prévisions météo

JEUDI 10	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16
						
8° / 22°	13° / 23°	10° / 24°	13° / 23°	13° / 25°	14° / 24°	13° / 22°
↙ 10 km/h	↗ 15 km/h	➤ 5 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	↗ 10 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h

(Source : Météo France, Rouen, 09/09/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Stades : majorité de colzas aux stades cotylédons à une feuille

Sur 36 parcelles observées, 4 n'ont pas levé, 11 sont au stade cotylédons, 9 au stade B1, 8 au stade B2, 2 au stade B3 et 2 au stade B4.



Stade A (coty), proche B1



Stade B2



Stade B3



Stade B4

Altises d'hiver et petites altises : vigilance en place

Observations cuvettes jaunes

Les cuvettes jaunes servent à repérer l'arrivée puis l'activité des altises en parcelle. Ce n'est pas un indicateur de risque à proprement parler.

- **Petites altises (altises des crucifères)** : 4 pièges positifs sur 26 relevés cette semaine, avec 1 à 15 individus par piège positif.
- **Grosses altises (= altise d'hiver)** : 7 pièges positifs sur 29 relevés, avec 1 à 7 individus et une moyenne de 2 individus par piège positif.

→ Reportez-vous en fin de BSV pour un rappel sur l'identification des 2 espèces.

Observations sur plantes

Des morsures, probablement occasionnées par des petites altises, sont observées dans 13 des 29 parcelles examinées cette semaine. Dans les parcelles concernées, la proportion de plantes présentant des morsures varie de 5 à 100 %, pour une moyenne de 26 %

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'à 3-4 feuilles. 8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommés.



Quelques piqûres ET surface détruite <25%



Piqûres significatives ET surface détruite ≥ 25%

Mesures préventives

Obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation.

Afin d'éviter le déplacement de **petites altises** sur les colzas de l'année à un stade sensible (levée-3 feuilles), ne pas détruire les repousses de colza avoisinantes au moment critique.

R **Résistance** : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyrèthrinoïdes » présente un risque de résistance. Les petites altises ne sont pas concernées dans l'état actuel des connaissances.

Analyse du risque altise

Colzas globalement moins avancés qu'à la même date en 2025.

Risque faible à ce jour, les morsures observées étant encore limitées. Les parcelles les moins avancées ou présentant une faible vigueur doivent néanmoins faire l'objet d'une surveillance attentive.

Les premières captures constituent un signal de vigilance, mais ne traduisent pas à elles seules un risque pour la culture.

Une baisse des températures suivie d'un réchauffement peut favoriser le déclenchement des migrations d'altises d'hiver : leur activité pourrait donc évoluer dans les prochains jours.

Le risque doit être apprécié à l'échelle de chaque parcelle, en comparant la vitesse d'accumulation des dégâts à la croissance du colza.

Limaces : risque limité à ce jour

Observations

Sur les 27 parcelles observées, 3 présentent de faibles dégâts de limaces. Le risque reste limité à ce jour.

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque « limaces ». Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible. Accordez une importance toute particulière aux parcelles à risque.

Facteurs de risque et surveillance Les sols creux, motteux ou riches en résidus pailleux sont particulièrement favorables aux limaces. Positionner un piège à la surface du sol — carton plastifié, tuile, soucoupe, planche ou, de préférence, piège de type INRA — permet de suivre leur activité.

Analyse du risque

Le risque est faible à l'échelle du réseau. Il doit toutefois être apprécié à la parcelle, notamment dans les colzas peu développés et les sols motteux ou pailleux. Les pluies annoncées pourraient favoriser une reprise d'activité : maintenir la surveillance dans les situations à risque.



Punaises : des attaques localisées signalées en Normandie

Hors réseau BSV, 10 à 15 signalements d'attaques de punaises sur jeunes colzas sont à ce jour enregistrés en Basse-Normandie.

Des cas plus fréquents et dommageables, sont rapportés cette année dans d'autres régions de France (Centre, Bretagne, Poitou-Charentes, Bourgogne).

Après un été particulièrement chaud et sec, ces insectes phytophages et polyphages recherchent des végétaux encore verts lorsque leurs plantes hôtes se dessèchent ou disparaissent. Ils peuvent alors se concentrer sur les repousses et les jeunes colzas en cours de levée. Plusieurs espèces peuvent être impliquées.

Le risque reste localisé, mais les dégâts peuvent être importants lorsque des populations très abondantes atteignent des colzas en cours de levée. Surveiller en priorité les bordures et les parcelles voisines de repousses de colza, de tournesol ou de lins. En cas de présence abondante de punaises dans une parcelle adjacente, différer si possible les travaux susceptibles de provoquer leur déplacement.



- Plus d'infos sur le site de Terres Inovia [en cliquant ici](#)
- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#).

Prochain BSV le 16 septembre 2026

Notes Nationales Biodiversité → cliquer sur les vignettes



Produits de Biocontrôle : [infos](#)

Résistances aux pesticides : [infos](#)

Du bon usage des cuvettes jaunes

La plupart des insectes ravageurs du colza sont attirés par la couleur jaune.

L'altise d'hiver (grosse altise) fait exception. Pour cette dernière, le piège en position enterrée joue le rôle de « piège d'interception », c'est-à-dire que les altises tombent dedans par hasard au gré de leur déplacement en parcelle. La cuvette permet dans ce cas de révéler la présence et l'activité du ravageur, mais ne l'attire pas particulièrement.



Mise en place

- Dès le semis, placer les cuvettes dans le colza à 10 m de la bordure, si possible à proximité ou le plus proche d'un ancien champ de colza récolté l'été dernier ;
- Remplir les cuvettes avec environ 1 litre d'eau additionnée de quelques gouttes de mouillant (type liquide vaisselle, par exemple) ;
- A l'automne, il est souvent plus facile de placer une cuvette directement posée sur le sol. **ATTENTION, vis-à-vis de l'altise d'hiver, ce positionnement est beaucoup moins efficace que la position "enterrée".**

Entretien et suivi

- Durant les périodes de risque, visiter les pièges au moins une fois par semaine ;
- Tenir propre les pièges, filtrer les insectes capturés au moment des relevés et remplacer l'eau régulièrement ;
- Astuce : prévoir un bidon qui reste dans la parcelle pour "refaire le plein". Ne pas laisser de bidon (surtout s'il est jaune) au pied même d'une cuvette.

Disposition

- Pour capturer l'altise d'hiver, la cuvette doit être enterrée. Laisser le bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.
- Pour capturer les petites altises et tous les autres insectes, la cuvette doit être comme « posée » sur la végétation au fil du temps (l'extrémité haute des feuilles du colza affleure le bas de la cuvette).

Annexe - Distinguer les petites altises des grosses altises

	Altises des crucifères (petites altises)	Altise d'hiver (grosse altise)
Apparence	 Petit coléoptère noir ou bicolore (noir avec une large bande longitudinale jaune sur chaque aile). Tête, thorax, fémur et bouts de pattes noirs, tibias roux.	 Coléoptère de forme oblongue, corps noir et brillant à reflets bleus métalliques sur le dos. Tête, extrémités des pattes, et antennes rousses. Grosses « cuisses » sur les pattes arrière.
Taille	2 à 2,5 mm	3 à 5 mm
Dégâts	Morsures circulaires d'1 mm de diamètre, avec ou sans perforation, des cotylédons et limbes de plus jeunes feuilles	Morsures circulaires d'1 à 2 mm de diamètre, avec ou sans perforation des cotylédons et limbes de plus jeunes feuilles
Nuisibilité	En été, pullulations fréquentes des adultes sur repousses de colza d'hiver ou autres crucifères. Les jeunes colzas, tout particulièrement ceux localisés en bords de champs et levant avant le 25 août sont les plus vulnérables.	Dégâts considérables en cas d'envahissement massif sur un colza en cours de levée (retards de développements, pertes de plantules). La nuisibilité augmente d'autant plus que le rapport de force « vigueur du colza / prélèvements foliaires » est défavorable à la culture.
Pic d'activité des adultes	2 ^{ème} quinzaine d'août, début septembre. Les petites altises sont peu mobiles à cette époque. Elles se répartissent de façon très hétérogène et se concentrent surtout en bordures de champs de colza. Ces insectes ont une activité essentiellement diurne.	2 ^{ème} ou 3 ^{ème} décade de septembre. Les altises d'hiver sont très mobiles à cette époque et investissent souvent l'intégralité des parcelles. L'insecte a une activité essentiellement nocturne.
Prévention / Facteurs de risque	Eviter de détruire mécaniquement des repousses de colza infestées de petites altises à proximité immédiate d'un colza en phase de levée.	Une levée précoce (avant 25 août) réduit la période de sensibilité de la culture. Les champs de repousses de colza ne jouent pas spécialement de rôle « piège » ou de menace supplémentaire.
Surveillance	Dès le semis, disposer un piège jaune au sol puis, dès la levée, à hauteur de végétation. Les captures éventuelles servent à révéler l'activité de l'insecte. Observer le colza et relever les pièges de la levée jusqu'au stade 3 feuilles, une à deux fois / semaine. Avant toute décision, évaluer la présence d'insectes aux heures les plus chaudes de la journée et la présence de morsures. Renforcer la vigilance par temps chaud et sec.	Dès le semis, placer et maintenir un piège jaune en position « enterrée », les bords supérieurs ne dépassant pas 1-2 cm au-dessus du sol. Les captures servent à révéler l'activité de l'insecte. Observer le colza de la levée jusqu'au stade 3 feuilles, plusieurs fois par semaine. Avant toute décision, évaluer la présence d'insectes à la tombée de la nuit et la présence éventuelle des morsures (et de leur intensité). Renforcer la vigilance si colza peu vigoureux au démarrage, en sols argileux, motteux, avec de nombreux résidus pailleux.