



Colza

Normandie

BSV n°15-24 le 10 septembre 2025 (Semaine 37)


Le réseau de parcelles BSV de colza est toujours en cours de construction.

Parcelles BSV observées du 2025-09-02 au 2025-09-09

29 parcelles sont enregistrées dans la base (semis du 01/08 au 06/09, moy = 23/08).


Le risque limace est réel, très dépendant des situations.

Quelques cuvettes ont piégé les toutes premières altises ce week-end. Pas de risque majeur à ce jour pour la culture.




Contexte météo

Pluies du 22 au 31 août



Pluies du 01 au 07 septembre



Les pluies quotidiennes, même faibles, donnent un coup de pouce à la culture. Toutefois, les lits de semences ont pu être asséchés par les températures élevées couplées au vent le week-end dernier. La qualité de levée est parfois contrastée, un peu poussive dans certains secteurs de l'Eure en particulier.

De nouvelles averses traverseront la région d'ici une semaine.

Stade : levée à B3

Sur 29 parcelles observées :

- 5 parcelles n'ont pas encore levé ou pointent à peine ;
- 10 parcelles sont au stade cotylédons
- 6 parcelles au stade B1 (une feuille) ;
- 5 au stade B2 (2 feuilles) ;
- 3 parcelles entre B3 et B6 (3 et 6 feuilles).



Cotylédons et première feuille naissante



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06.83.04.29.10
j.lieven@terresinovia.fr

Animateur suppléant

Thomas MEAR
TERRES INOVIA
06.64.14.31.18
t.mear@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président de la Chambre
d'agriculture de région
Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

Abonnez-vous sur

normandie.chambres-agriculture.fr

Action du plan Écophyto pilotée
par les Ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de
la santé et de la recherche avec
l'appui technique et financier de
l'Office Français de la Biodiversité



Avec le soutien financier de



Altises d'hiver et petites altises : calme pour l'instant

Le début du plateau d'activité des altises d'hiver se situe généralement vers le 20 septembre. Les quelques captures ces jours-ci ne doivent pas faire céder à la panique. C'est à partir de la semaine prochaine que les choses pourraient évoluer.

Pas de protection par anticipation, cela ne sert à rien.



Observations

Les cuvettes jaunes servent à repérer l'arrivée puis l'activité des altises en parcelle. Ce n'est pas un indicateur de risque à proprement parler.

- **Petites altises (altises des crucifères)** : signalées dans 4 pièges sur 18 cette semaine (1 à 2 individus piégés)
- **Grosses altises (= altise d'hiver)** : 4 pièges positifs sur 20 relevés (1 à 3 individus)

Des morsures sont observées sur plantes, sans réelle menace importante, sur 6 parcelles du réseau.

Gestion du risque

Période et seuil de risque vis-à-vis des morsures d'altises (petites et grosses altises) :

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza. 8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommée. Tenir compte d'une moyenne de défoliation observée sur toutes les feuilles des plantes.

Si le feuillage est déjà gravement affecté par d'autres ravageurs défoliateurs (limaces, tenthrèdes par exemple), c'est le pourcentage total de défoliation qui doit être considéré.



Mesures préventives : obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation.

Afin d'éviter le déplacement de **petites altises** sur les colzas de l'année à un stade sensible (levée-3 feuilles), éviter de détruire les repousses de colza avoisinantes au moment critique

R Résistance : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyrèthrinoïdes » présente un risque de résistance. Les petites altises ne sont pas concernées dans l'état actuel des connaissances.

Analyse du risque vis-à-vis des altises

Le risque reste pour l'instant globalement faible. L'attention devra être maximale dès le début de semaine prochaine. A priori le temps prévu n'est pas favorable aux insectes dans les prochains jours.

Vigilance renforcée dans les situations agronomiques suivantes : sols motteux, argileux, pauvres en azote / phosphore, parcelles proches de bois, haies, colzas récoltés en 2024, précédent blé, sans labour, levée > 1er septembre.

L'observation de l'évolution des dégâts au quotidien est essentielle avant toute décision, et ce jusqu'à 3 feuilles révolues de la culture.

Limaces : pluies récentes = risque possible

Observations

6 parcelles sur 22 observées signalent la présence de faibles dégâts de limaces (2 à 3 % de surface foliaire mangée sur cotylédons ou jeunes feuilles).

Période et seuil de risque

Risque possible de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque « limaces ». Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible. Accordez une importance toute particulière aux parcelles à risque.

Mesures préventives : lors des préparations de semis, éviter au possible les sols creux, trop pailleux et motteux. Positionner un piège à limaces : disposer un abri sur la surface du sol (carton plastifié, tuile, soucoupe plastique, planche etc.) ou, mieux, un véritable piège à limaces type « INRA » (photo).



Analyse du risque

Le risque est très variable. L'an passé, les limaces avaient causé de nombreux dégâts. Cette année le curseur de risque est plus bas.

L'appréciation du risque se fait à l'échelle de la parcelle.

Prochain BSV le 17 septembre 2025

-----Notes Nationales Biodiversité-----

Cliquer sur les images



Produits de Biocontrôle : [cliquer pour en savoir plus](#)



Résistances aux pesticides : [cliquer pour en savoir plus](#)

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de chaque exploitation. Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par des observations à la parcelle avant toute prise de décision.

Annexe - Du bon usage des cuvettes jaunes

La plupart des insectes ravageurs du colza sont attirés par la couleur jaune.

L'altise d'hiver (grosse altise) fait exception. Pour cette dernière, le piège en position enterrée joue le rôle de « piège d'interception », c'est-à-dire que les altises tombent dedans par hasard au gré de leur déplacement en parcelle. La cuvette permet dans ce cas de révéler la présence et l'activité du ravageur, mais ne l'attire pas particulièrement.



Mise en place

- Dès le semis, placer les cuvettes dans le colza à 10 m de la bordure, si possible à proximité ou le plus proche d'un ancien champ de colza récolté l'été dernier ;
- Remplir les cuvettes avec environ 1 litre d'eau additionnée de quelques gouttes de mouillant (type liquide vaisselle, par exemple) ;
- A l'automne, il est souvent plus facile de placer une cuvette directement posée sur le sol. **ATTENTION, vis-à-vis de l'altise d'hiver, ce positionnement est beaucoup moins efficace que la position "enterrée".**

Entretien et suivi

- Durant les périodes de risque, visiter les pièges au moins une fois par semaine ;
- Tenir propre les pièges, filtrer les insectes capturés au moment des relevés et remplacer l'eau régulièrement ;
- Astuce : prévoir un bidon qui reste dans la parcelle pour "refaire le plein". Ne pas laisser de bidon (surtout s'il est jaune) au pied même d'une cuvette.

Disposition

- Pour capturer l'altise d'hiver, la cuvette doit être enterrée. Laisser le bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.
- Pour capturer les petites altises et tous les autres insectes, la cuvette doit être comme « posée » sur la végétation au fil du temps (l'extrémité haute des feuilles du colza affleure le bas de la cuvette).
- Astuce : on peut enterrer une première cuvette, qui restera à demeure, et fixer une seconde cuvette sur la même tige qui sert de support.

