



Colza



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
07 61 82 30 33
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des
Chambres d'agriculture de Normandie et des
partenaires.

À consulter sur : normandie.chambres-agriculture.fr




BSV n°16-26 le 16 septembre 2026 (Semaine 38)

L'essentiel de la semaine

- 55 parcelles enregistrées. 46 observées cette semaine.
- Colzas majoritairement aux stades 2-3 feuilles dans les parcelles homogènes. Premières parcelles au stade B4.
- Hausse des captures de **grosses altises**. Les morsures progressent mais les niveaux de défoliation restent globalement modérés.
- Signalements d'attaques de punaises en augmentation dans le 14, 61 et 76, avec des premiers cas dans le 27.

Parcelles BSV observées du 2026-09-09 au 2026-09-15



Prévisions météo

JEUDI 17	VENDREDI 18	SAMEDI 19	DIMANCHE 20	LUNDI 21	MARDI 22	MERCREDI 23
						
11° / 21°	9° / 21°	14° / 25°	14° / 23°	11° / 22°	10° / 25°	12° / 27°
↙ 20 km/h 45 km/h	➤ 15 km/h	➤ 20 km/h	➤ 15 km/h	▼ 10 km/h	➤ 15 km/h	◀ 15 km/h

(Source : Météo France, Argentan, 16/09/2026 à 09h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Majorité de colzas aux stades 2-3 feuilles, 20 % ont désormais atteint B4.

Sur 46 parcelles observées, 3 n'ont pas entièrement levé, 2 sont au stade cotylédons, 7 au stade B1, 15 au stade B2, 10 au stade B3 et 7 au stade B4 et 2 au stade B5.



Stade A (coty), proche B1



Stade B2



Stade B3



Stade B4

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRIAL, AGRICOACH, AGRICULTEUR, CA 14, CA 27, CA 61, CA 76, COOP DE BELLEME, D2N, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE

Altises d'hiver et petites altises : vigilance en place

Observations cuvettes jaunes

Les cuvettes jaunes servent à repérer l'arrivée puis l'activité des altises en parcelle. Ce n'est pas un indicateur de risque à proprement parler.

- **Petites altises (altises des crucifères)** : 9 pièges positifs sur 36 relevés cette semaine (soit 25 % contre 17 % semaine dernière), avec 1 à 10 individus par piège positif (moy = 3.6).
- **Grosses altises (= altise d'hiver)** : 27 pièges positifs sur 40 relevés (soit 68 % contre 23 % semaine dernière), avec 1 à 40 individus et une moyenne de 7.2 individus par piège positif (contre 2 semaine dernière).



Grosse altise


Observations sur plantes

Des morsures, provoquées par les petites et/ou grosses altises, sont observées dans 34 des 40 parcelles examinées cette semaine (85 % des parcelles contre 47 % semaine dernière). Dans les parcelles concernées, la proportion de plantes présentant des morsures varie de 2 à 100 %, pour une moyenne de 34 (contre 26 % semaine dernière).


Les estimations de % de défoliation vont de 1 à 15 (moy = 5.3 %, contre 3.8 % semaine dernière).

Altise d'hiver : captures dans les pièges

du 09/09/2026 au 15/09/2026




du 02/09/2026 au 14/09/2026




● Aucune capture ; ● 1 à 5 individus ; ● 5 à 10 ; ● > 10

Altises : % de plantes avec morsures

du 09/09/2026 au 15/09/2026



du 02/09/2026 au 14/09/2026



● 0 % ; ● 1 à 50 % ; ● 51 à 80 % ; ● > 80

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'à 3-4 feuilles. 8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommés.



Quelques piqûres ET surface détruite <25%



Piqûres significatives ET surface détruite ≥ 25%

Mesures préventives

Obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation.

Afin d'éviter le déplacement de **petites altises** sur les colzas de l'année à un stade sensible (levée-3 feuilles), ne pas détruire les repousses de colza avoisinantes au moment critique.



Résistance : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyréthrinoïdes » présente un risque de résistance. Les petites altises ne sont pas concernées dans l'état actuel des connaissances.

Analyse du risque altise

L'activité des altises s'est nettement intensifiée cette semaine : hausse des captures et généralisation des morsures. Pour autant, l'intensité des dégâts reste à ce jour globalement modérée dans le réseau, avec 5,3 % de surface foliaire détruite en moyenne.

La situation peut néanmoins évoluer rapidement dans les colzas encore jeunes (< B4), peu vigoureux présentant une levée hétérogène ou étant sous concurrence de repousses de céréales. Dans ces situations, une surveillance très régulière est nécessaire. Le risque doit être apprécié à l'échelle de chaque parcelle en comparant la progression des dégâts à la capacité de croissance du colza.

Le risque doit être apprécié à l'échelle de chaque parcelle, en comparant la vitesse d'accumulation des dégâts à la croissance du colza.

Vigilance renforcée dans les situations agronomiques suivantes : sols motteux ou argileux, faible disponibilité en azote et phosphore, précédent blé, absence de labour, levées lentes ou tardives, proximité de bois, de haies ou de parcelles de colza récoltées en 2026.

Ci-dessous, toutes ces plantes sont piquées mais ne présentent pas la même sensibilité.



COTYLEDON

STADE B1

STADE B2

STADE B2-B3

STADE B3

Limaces : risque limité à ce jour

Observations

Sur les 36 parcelles observées, 6 présentent de faibles dégâts de limaces. Le risque reste limité à ce jour.

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque « limaces ». Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible. Accordez une importance toute particulière aux parcelles à risque.

Facteurs de risque et surveillance Les sols creux, motteux ou riches en résidus pailleux sont particulièrement favorables aux limaces. Positionner un piège à la surface du sol — carton plastifié, tuile, soucoupe, planche ou, de préférence, piège de type INRA — permet de suivre leur activité.

Analyse du risque

Risque faible à l'échelle du réseau. Il doit toutefois être apprécié à la parcelle, particulièrement dans les colzas encore peu développés et dans les sols motteux ou riches en résidus.



Punaises : signalements toujours en augmentation en Normandie

Les attaques de punaises constituent actuellement un point de vigilance important, dans un contexte de sols secs contrariant l'installation des colzas. Leur présence se maintient dans plusieurs secteurs. Les dégâts sont très variables : de quelques mètres de bordure affectés jusqu'à la destruction partielle, voire totale, du colza dans certaines parcelles.

→ Plusieurs dizaines de signalements dans du colza semé ont désormais été recensés en Normandie. Certains secteurs ressortent davantage : sud de l'Orne (Bellême, Alençon), littoral au nord-ouest de Caen et plusieurs foyers dans l'ouest de la Seine-Maritime. Des cas apparaissent aussi dans l'Eure.

Le phénomène reste plus sporadique dans les zones de production de Haute-Normandie, tandis que les signalements sont désormais fréquents dans plusieurs secteurs de Basse-Normandie.

Aucune méthode de lutte spécifique n'est actuellement identifiée contre ces attaques sur jeunes colzas.

Avant d'envisager un resemis, vérifier impérativement que les punaises ne sont plus présentes en abondance dans la parcelle ou son environnement proche. À cette date, le sec et l'avancement du calendrier rendent par ailleurs les conditions de resemis de moins en moins favorables. Un colza ressemé tardivement serait également davantage exposé aux altises d'hiver durant ses premiers stades.


Après un été particulièrement chaud et sec, les punaises, du genre *Nysius*, phytophages et polyphages peuvent se concentrer sur les repousses et les jeunes colzas en cours de levée. Plusieurs espèces peuvent être impliquées.

Surveiller en priorité les bordures ainsi que les parcelles voisines de repousses de colza, tournesol ou lin. En cas de présence abondante de punaises dans une parcelle ou une végétation adjacente, différer si possible les travaux susceptibles de provoquer leur déplacement vers les jeunes colzas.

Plus d'infos sur le site de Terres Inovia [en cliquant ici](#)

Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#).

Carte des signalements de punaises dans les colzas semés – 16/09/2026 – enquête Terres Inovia



Prochain BSV le 23 septembre 2026

Notes Nationales Biodiversité → cliquer sur les vignettes



Produits de Biocontrôle : [infos](#)

Résistances aux pesticides : [infos](#)