



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
06 76 72 78 92
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des
Chambres d'agriculture de Normandie et des
partenaires.

À consulter sur : normandie.chambres-agriculture.fr




BSV n°17-26 le 23 septembre 2026 (Semaine 39)

L'essentiel de la semaine

- 67 parcelles enregistrées. 50 observées cette semaine.
- Colzas majoritairement aux stades 3-4 feuilles dans les parcelles homogènes. Premières parcelles au stade B6.
- Pression soutenue des altises. Les jeunes colzas vulnérables sont à surveiller de très près.
- Signalements de punaises toujours fréquents dans plusieurs secteurs des 14, 61 et 76 ; quelques cas également dans le 27.
- Premiers signalements de pucerons verts cette semaine.

Parcelles BSV observées du 2026-09-16 au 2026-09-23



Prévisions météo

JEUDI 24	VENDREDI 25	SAMEDI 26	DIMANCHE 27	LUNDI 28	MARDI 29	MERCREDI 30
11° / 25°	10° / 28°	11° / 24°	11° / 25°	13° / 22°	13° / 25°	14° / 22°
▼ 15 km/h	► 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	► 20 km/h 45 km/h	▲ 15 km/h 45 km/h


(Source : Météo France, Le Neubourg, 23/09/2026 à 09h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Majorité de colzas aux stades 3-4 feuilles, 40 % ont désormais atteint B4.

Temps toujours très sec avec des températures au dessus de normales. Hors réseau BSV, beaucoup de levées, en attente et de jeunes colzas loin d'être sécurisés.

Sans surprise, les stades font le grand écart : les situations sont très hétérogènes.

Un effet de la date de semis, croisé avec les précipitations de fin août, est nettement observé. Les semis précoces, avant fin août, sont globalement plus encourageants.



Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRIAL, AGRICOACH, AGRICULTEUR, AXONE, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, COOP CREULLY, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE

Reconnaître les stades 1 à 4 feuilles du colza



Stade A (coty), proche B1



Stade B2



Stade B3



Stade B4

Altises d'hiver et petites altises : pression soutenue

Observations cuvettes jaunes

Les cuvettes jaunes servent à repérer l'arrivée puis l'activité des altises en parcelle. Ce n'est pas un indicateur de risque à proprement parler.

- **Petites altises (altises des crucifères)** : 17 pièges positifs sur 34 relevés cette semaine (soit 50 % contre 25 % et 17 % semaines précédentes), avec 1 à 30 individus par piège positif (moy = 10).
- **Grosses altises (= altise d'hiver)** : 40 pièges positifs sur 47 relevés (soit 85 % contre 68 et 23 % semaines précédentes), avec 1 à 150 individus et une moyenne de 24 individus par piège positif (contre 7 et 2 semaines d'avant).



Grosse altise


Observations sur plantes

Des morsures, provoquées par les petites et/ou grosses altises, sont observées dans 33 des 36 parcelles examinées cette semaine (92 % des parcelles contre 77 et 47 % semaine dernière). Dans les parcelles concernées, la proportion de plantes présentant des morsures varie de 2 à 100 %, pour une moyenne de 49 (contre 34 et 26 % semaines précédentes).

Les estimations de % de défoliation vont de 1 à 20 (moy = 6 % contre 5 et 4 % semaines d'avant).


Altise d'hiver : captures dans les pièges

Du 16/09/2026 au 22/09/2026




● Aucune capture ; ● 1 à 5 individus ; ● 5 à 10 ; ● > 10

du 09/09/2026 au 15/09/2026




Altises : % de plantes avec morsures

Du 16/09/2026 au 22/09/2026



● 0 % ; ● 1 à 50 % ; ● 51 à 80 % ; ● > 80

du 09/09/2026 au 15/09/2026



Période et seuil de risque

De la levée jusqu'à 3-4 feuilles.

8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommés.



A gauche : quelques piqûres ET surface détruite <25%



A droite : Piqûres significatives ET surface détruite ≥ 25%

Mesures préventives

Obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation.

Afin d'éviter le déplacement de **petites altises** sur les colzas de l'année à un stade sensible (levée-3 feuilles), ne pas détruire les repousses de colza avoisinantes au moment critique.

R **Résistance** : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyrèthrinoïdes » présente un risque de résistance. Les petites altises ne sont pas concernées dans l'état actuel des connaissances.

Analyse du risque altise

L'activité des altises d'hiver mais aussi des petites altises s'est encore intensifiée cette semaine : hausse des captures et des morsures. La sévérité des dégâts reste toutefois relativement modérée dans le réseau, avec moins de 20 % des cas dépassant le seuil de 80 % de plantes avec morsures.

60 % des parcelles sont en phase sensible. Surveillez attentivement les colzas jeunes n'ayant pas 4 feuilles, et en particulier les colzas à peine levés, stade coty-2 feuilles. Les risques sont accrus dans les situations peu vigoureuses présentant une levée hétérogène ou étant sous concurrence de repousses de céréales.

Le risque doit être apprécié à l'échelle de chaque parcelle en comparant la progression des dégâts à la capacité de croissance du colza.

Ci-dessous, toutes ces plantes sont piquées mais ne présentent pas la même sensibilité.



COTYLEDON

STADE B1

STADE B2

STADE B2-B3

STADE B3

Limaces : risque limité à ce jour

Observations

Sur les 26 parcelles observées, 3 présentent de faibles dégâts de limaces. Le risque reste limité à ce jour.

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Facteurs de risque et surveillance Les sols creux, motteux ou riches en résidus pailleux sont particulièrement favorables aux limaces. Positionner un piège à la surface du sol — carton plastifié, tuile, soucoupe, planche ou, de préférence, piège de type INRA — permet de suivre leur activité.

Analyse du risque

Risque très faible à l'échelle du réseau. Si des pluies surviennent, surveillez les parcelles à sols motteux ou riches en résidus.



Pucerons verts : premiers signalements

Observations

Sur les 27 parcelles observées, 7 présentent des pucerons verts dont 3 à plus de 20 % de plantes porteuses.

Période et seuil de risque

Risque de transmission de viroses jusqu'au stade B6 (6 feuilles).

Pour les variétés sensibles, hors « TuYv » (ex : BESSITO, BLACKJACK, CODEX, CRATEO, HELYPSE, ES MAMBO, GENEROSO, HECLAIR, HEMMA, KWS GLORIOS, KWS MIRANOS, LID ULTIMO, RGT EROS, RGT KEOS, variétés éruciques...), le seuil indicatif de risque est de 20% de pieds porteurs de pucerons avant le stade B6

Mesures préventives : les variétés dites « TuYv » à résistance partielle vis-à-vis du virus TuYv limitent fortement les risques de viroses, à tel point que la protection est rarement rentabilisée

Analyse du risque

Risque relativement faible à l'échelle du réseau. 3 parcelles sur 27 ont atteint ou dépassé le seuil de 20 % de plantes porteuses de pucerons verts. A surveiller.



Résistance : depuis de nombreuses années, les pucerons verts ont développé des résistances aux pyréthriinoïdes et au pirimicarbe.



Punaises : les signalements se poursuivent en Normandie

Les signalements se poursuivent en Normandie, avec une situation très variable selon les secteurs. Les attaques les plus fréquentes concernent notamment l'Orne (diagonale Argentan-Bellême), le littoral nord de Caen et le secteur Le Havre-Étretat. Des cas plus ponctuels sont également signalés dans l'Eure, le bocage virois, la Manche et le Pays de Caux.

Les dégâts peuvent concerner uniquement les bordures mais aussi progresser davantage dans les parcelles.

La proximité d'un ancien colza récolté cet été, souvent peu ou pas travaillé, constitue un point commun à quasiment tous les signalements. Les graines laissées au sol puis les repousses pourraient avoir entretenu les populations durant l'été, avant leur déplacement vers les jeunes colzas ; cette hypothèse reste toutefois à confirmer.

Surveiller en priorité les bordures et les parcelles voisines d'anciens colzas ou de végétations desséchées, notamment aux heures chaudes de la journée. En présence de fortes populations dans une parcelle voisine, éviter si possible les interventions susceptibles de provoquer leur déplacement vers les jeunes colzas.

- Dernière info publiée sur le site de Terres Inovia [en cliquant ici](#)
- Signaler les attaques sur colza [en cliquant ici](#)
- Visualiser les signalements de punaises effectués à ce jour [en cliquant ici](#)



Prochain BSV le 30 septembre 2026

Notes Nationales Biodiversité → cliquer sur les vignettes



Produits de Biocontrôle : [infos](#)

Résistances aux pesticides : [infos](#)