



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante

Solana VERA
TERRES INOVIA
06 76 72 78 92
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie



BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des
Chambres d'agriculture de Normandie et des
partenaires.


À consulter sur : normandie.chambres-agriculture.fr

BSV n°20-26 le 14 octobre 2026 (Semaine 42)

L'essentiel de la semaine

- 60 parcelles observées cette semaine.
- Stade B4 à B10 voire plus.
- Activité toujours élevée des **altises d'hiver**, mais le risque se concentre désormais sur les colzas tardifs ou fortement pénalisés par les attaques antérieures.
- **Pucerons verts** stables, risque en diminution.
- **Mouche du chou** : les dégâts continuent d'être signalés dans plusieurs secteurs.
- Attention aux confusions entre **larves d'altises** et **larves de diptères** présentes dans les pétioles.

Parcelles BSV observées du 2026-10-07 au 2026-10-13




Prévisions météo

JEUDI 15	VENDREDI 16	SAMEDI 17	DIMANCHE 18	LUNDI 19	MARDI 20	MERCREDI 21
8° / 26°	11° / 18°	9° / 16°	8° / 15°	7° / 14°	9° / 16°	9° / 18°
▲ 10 km/h	▼ 20 km/h 40 km/h	► 20 km/h 45 km/h	► 15 km/h	► 15 km/h 40 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source : Météo France, Rouen, 14/10/2026 à 09h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Majorité de colzas à plus de 6 feuilles




La quasi-totalité des parcelles a désormais atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.

Ce constat ne doit toutefois pas masquer les nombreuses situations présentant des peuplements et/ou des stades hétérogènes.

Altises d'hiver : poursuite de l'activité, encore des situations délicates à gérer

Observations cuvettes jaunes

Grosses altises (= altise d'hiver) : 43 pièges positifs sur 45 relevés (soit 96 %), avec 1 à 91 individus et une moyenne de 26 individus par piège positif.



Observations sur plantes

La majorité des parcelles ne fait plus l'objet d'un suivi fin car elles sont sorties de la période de risques. Sur les 8 parcelles examinées n'ayant pas dépassé 4 feuilles, toutes portent des morsures. La proportion de plantes présentant des morsures varie de 20 à 100 %, pour une moyenne de 80 % (contre 79, 68, 49, 34 et 26 % les semaines précédentes).

Les pourcentages de défoliation vont de 5 à 50 (moy = 20 % contre 20, 12, 6, 5 et 4 % les semaines d'avant). Les niveaux d'attaques restent donc importants depuis plus d'une semaine.

Période et seuil de risque

De la levée jusqu'à 3-4 feuilles. 8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommés.

Mesures préventives

Obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation.

Résistance : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyrèthrinaïdes » présente un risque de résistance.

Analyse du risque altise d'hiver

La quasi-totalité des parcelles du réseau a désormais atteint ou dépassé le stade B4 et est sortie de la période de sensibilité principale aux morsures d'altises.


⚠ Toutefois, dans certains secteurs (ex. sud 61, sud 27), des parcelles tardives fortement endommagées par le cumul des morsures depuis 15 à 20 jours restent en difficulté, malgré un stade B4-B5 parfois atteint. La croissance des nouvelles feuilles reste lente et la vigueur des plantes fortement pénalisée.



Pucerons verts : pression stable, risque en diminution

Observations

Sur les 35 parcelles observées (tous stades confondus), 17 présentent des pucerons verts dont 5 à 100 % de plantes porteuses (moy 38 %, contre 42, 38 et 33 % semaines précédentes). Sur les 17, 7 sont dans la période de sensibilité importante (stade ≤ 6 feuilles).



Période et seuil de risque

Risque de transmission de viroses jusqu'au stade B6 (6 feuilles).

Pour les variétés sensibles, hors « TuYv » (ex : BESSITO, BLACKJACK, CODEX, CRATEO, HELYPSE, ES MAMBO, GENEROSO, HECLAIR, HEMMA, KWS GLORIOS, KWS MIRANOS, LID ULTIMO, RGT EROS, RGT KEOS, variétés éruciques...), le seuil indicatif de risque est de 20% de pieds porteurs de pucerons avant le stade B6.

Mesures préventives : les variétés dites « TuYv » à résistance partielle vis-à-vis du virus TuYV limitent fortement les risques de viroses.

Analyse du risque

Le risque tend à diminuer à l'échelle du réseau, principalement du fait de l'avancement des stades : de moins en moins de parcelles se trouvent encore dans la période de sensibilité. Au global, seules 3 parcelles sur 35 (soit 8% contre 12 et 6 % les semaines avant) ont atteint ou dépassé le seuil de 20 % de plantes porteuses de pucerons verts dans la période « Levée → 6 feuilles ».

Résistance : depuis de nombreuses années, les pucerons verts ont développé des résistances aux pyréthriinoïdes et au pirimicarbe.

Attention aux confusions entre larves d'altises et larves de diptères

Depuis 8 jours, il est possible d'observer des larves de diptères (mouches de type « mineuse ») localisées dans les pétioles du colza. Inoffensives, ces larves sont facilement visibles du fait de leur taille, nettement supérieure à celle des larves d'altises.

Attention donc à ne pas confondre avec les larves d'altises. Ces dernières sont plus petites, possèdent trois paires de pattes et présentent des extrémités du corps de

couleur noire.

ci-dessus, à gauche : larve de grosse altise au stade L1 ; à droite : larve de diptère.

Photo de droite : larves de diptères dans un pétiole de feuille.




Photo C. Joulia CA Normandie

Mouches du chou : des dégâts signalés depuis 15 jours

Observations

Les dégâts sont fréquemment signalés cette année : 16 signalements sont recensés parmi 52 parcelles observées au cours des 15 derniers jours, auxquels s'ajoutent de nombreuses observations hors réseau, notamment en Seine-Maritime.

Plusieurs asticots peuvent être présents sur une même plante et des dégâts irréversibles sont déjà observés dans les parcelles les plus touchées.

Période et seuil de risque : du stade B3 à formation de la rosette. Aucun moyen de lutte directe n'est disponible.

Les adultes de mouche du chou ont pondu au collet des plantes. Les asticots (de 2 à 8 mm) rongent le pivot dans des galeries ouvertes mais parfois profondes. Si les pivots sont sectionnés (sur des colzas peu développés), les préjudices deviennent significatifs lorsque le peuplement de colza restant est très déficitaire.

Mesures préventives : une implantation de qualité favorise le développement des pivots et limite la gravité des attaques.

Régulation par de nombreux auxiliaires : carabes et staphylins qui dévorent les œufs, hyménoptères parasitoïdes qui détruisent les pupes, champignons entomopathogènes qui tuent les adultes ou les rendent stériles.



Photo F. D'Hubert, CA Normandie

Prochain BSV le 21 octobre 2026

Notes Nationales Biodiversité → cliquer sur les vignettes



Produits de Biocontrôle : [infos](#)

Résistances aux pesticides : [infos](#)