Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie

Terres Inovia

Animateur référent
Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06 83 04 29 10
j.lieven@terresinovia.fr

Animatrice suppléante
Solana VERA
TERRES INOVIA
06 76 72 78 92
s.vera@terresinovia.fr

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie


BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des Chambres d'agriculture de Normandie et des partenaires.
À consulter sur : normandie.chambres-agriculture.fr

CHAMBRES D'AGRICULTURE NORMANDIE

BSV n°24-26 le 12 novembre 2026 (Semaine 46)

L'essentiel de la semaine

- 44 parcelles observées cette semaine.
- 95 % des colzas ont atteint ou dépassé B6.
- **Larves d'altises** : progression des infestations confirmée par les tests Berlese. Surveillance à poursuivre, y compris dans les parcelles récemment protégées et les colzas vigoureux.
- Quelques captures de **charançon du bourgeon terminal** cantonnées au sud-est de l'Eure ; risque écarté ailleurs.



Prévisions météo

JEUDI 12	VENDREDI 13	SAMEDI 14	DIMANCHE 15	LUNDI 16	MARDI 17	MERCREDI 18
9° / 11°	4° / 12°	0° / 11°	3° / 14°	8° / 12°	6° / 12°	8° / 13°
15 km/h	10 km/h	15 km/h	25 km/h	25 km/h	20 km/h	25 km/h
40 km/h			60 km/h	55 km/h	55 km/h	55 km/h

(Source : Météo France, Vernon-27, 12/11/2026 à 09h00. Retrouvez les données météo actualisées ici)

Stades du colza

96 % des parcelles ont atteint ou dépassé le stade B6 cette semaine dans le réseau de suivi.

Un tiers des parcelles présente des peuplements jugés hétérogènes

20 % des parcelles observées ont un peuplement inférieur à 20 plantes/m².



Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :
AGRIAL, AGRICOACH, COOP CREULLY, CRA NORMANDIE, D2N, SOUFFLET AGRICULTURE

Larves d'altises : progression confirmée par les tests Berlese

Observations au champ




Lésions, cicatrices sur pétioles causées par l'entrée de larves d'altises

Les larves d'altises sont repérées au champ dans 43/55 parcelles depuis 3 semaines, soit 80 % des cas.

Les observations de larves ou de lésions sur pétioles continuent leur progression depuis 2 semaines (60% en moy de plantes avec larve(s), contre 48 et 25 % les semaines précédentes).

Les lésions dues à l'entrée de jeunes larves au niveau des pétioles sont facilement visibles.

Du 04/11 au 10/11/2026 | **Du 28/10 au 03/11/2026** | **Du 21 au 27/10/2026**



absence; 1 à 50 % de plantes avec au moins une larve ; entre 50 et 70 % .. avec au moins une larve ; > 70 % de plantes

Reconnaissance : Des larves de diptères inoffensives, de type *Phytomyza rufipes*, peuvent être confondues avec les larves d'altises. La distinction est pourtant assez nette : sans pattes, la larve de mouche a un aspect d'asticot, tandis que la larve d'altise, plus petite, possède trois paires de pattes, une tête bien visible et des extrémités foncées.




Observations / résultats des tests Berlese

Sur 32 résultats de tests Berlese dont certains encore provisoires, 23 sont positifs (soit 71 %), avec une variabilité de 1 à 28 larves/plante (moy ≈ 5-6 larves/plante). Les résultats nuls concernent principalement des prélèvements plus anciens ; certains tests plus récents sont encore en cours.

Période de risque

Du stade rosette jusqu'au décollement du bourgeon terminal. Une infestation larvaire importante peut faire suite à de faibles captures d'adultes, et inversement.

Les larves se développent dans les pétioles durant l'automne et l'hiver. Les dégâts deviennent préjudiciables lorsqu'elles migrent vers le cœur de la rosette, phénomène qui n'est pas systématique.



Résultats Test Berlese depuis 15 jrs.

0; 1 à < 3 larve/plante ; 3 à < 5; ≥ 5

Seuils indicatifs de risque

- Dissection au champ : 70 % de plantes avec au moins une larve.
- Test Berlese : 2-3 larves/plante, voire 5 larves pour un colza robuste et très bien alimenté.

Mesures préventives : colza sain et robuste, doté d'une bonne dynamique de croissance en biomasse (> 1.5 kg/m² en entrée hiver, peu de pertes hivernales à attendre) et d'un système racinaire optimal.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :
AGRIAL, AGRICOACH, COOP CREULLY, CRA NORMANDIE, D2N, SOUFFLET AGRICULTURE

Modélisation

Les larves L1 ou L2 aujourd'hui correspondent aux pontes fin septembre/début octobre. Leur développement a été favorisé par la douceur jusqu'à mi-octobre.

Le tableau indique des dates théoriques d'apparition, sans préjuger du niveau d'infestation.

Stations Météo-France	Hypothèse date accouplement altise adulte	Simulations des dates d'apparition des larves		
		Eclosion Larves L1	Mue Larves L2	Mue Larves L3
EVREUX (27)	20-sept.	9-oct.	16-oct.	27-oct.
	25-sept.	15-oct.	27-oct.	8-déc.
	1 oct.	16-nov.	Après 1er janv.	Après 1er janv.
	5 oct.	21-déc.	Après 1er janv.	Après 1er janv.
ROUEN (76)	20-sept.	10-oct.	16-oct.	30-oct.
	25-sept.	16-oct.	30-oct.	25-déc.
	1 oct.	20-nov.	Après 1er janv.	Après 1er janv.
	5 oct.	29-déc.	Après 1er janv.	Après 1er janv.
CAEN (14)	20-sept.	9-oct.	15-oct.	25-oct.
	25-sept.	15-oct.	25-oct.	13-nov.
	1 oct.	30-oct.	24-nov.	Après 1er janv.
	5 oct.	17-nov.	22-déc.	Après 1er janv.
ALENCON (61)	20-sept.	7-oct.	14-oct.	26-oct.
	25-sept.	15-oct.	27-oct.	23-nov.
	1 oct.	10-nov.	19-déc.	Après 1er janv.
	5 oct.	3-déc.	Après 1er janv.	Après 1er janv.

Après éclosion des œufs, les premières larves L1 rejoignent les pétioles des plantes.

Les stades larvaires ultérieurs (L2-L3) sont plus facilement observables que le stade juvénile.

Cases colorées : prise en compte des données météo de l'année en cours ;
Cases blanches : prise en compte des données météo de l'année en cours + données fréquentielles 2006-2025

Analyse du risque vis-à-vis des larves d'altises

Les premières détections, particulièrement précoces cette année, incitent à une grande vigilance.

Les infestations progressent depuis deux semaines mais restent très variables selon les parcelles.

Près d'une parcelle sur deux atteint désormais au moins l'un des niveaux indicatifs de risque : 70 % de plantes porteuses d'au moins une larve en observation visuelle ou 5 larves/plante au test Berlese.

Le diagnostic doit être réalisé à l'échelle de chaque parcelle, idéalement par test Berlese, et poursuivi jusqu'à mi-décembre compte tenu de l'échelonnement des éclosions.

Les colzas récemment protégés comme les colzas vigoureux issus de levées précoces restent à surveiller.

Résistance : le couple « altise d'hiver / pyréthrinoïdes » présente un risque de résistance, pouvant localement être forte (résistance type Skdr).

Attention à ne pas attribuer systématiquement une efficacité insuffisante au champ à une résistance forte aux pyréthrinoïdes. En cas de doute, des tests Berlese réalisés avant intervention puis 7 à 10 jours après intervention peuvent contribuer au diagnostic.

En Normandie, la résistance forte de type Skdr n'est pas généralisée. Le recours à une solution alternative aux pyréthrinoïdes ne se justifie qu'en cas de forte suspicion de baisse d'efficacité

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :
AGRIAL, AGRICOACH, COOP CREULLY, CRA NORMANDIE, D2N, SOUFFLET AGRICULTURE


Charançon du bourgeon terminal : vers la fin du risque

Observations cuvettes jaunes

Sur 32 cuvettes relevées cette semaine, 4 ont capturé : à CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE (27), HENNEZIS (27), SAINT-ELIER (27) et SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY (27).

NB : les relevés de ce début de semaine peuvent intégrer des captures datant de plus de 7 jours.

Du 04 au 11 nov. 2026 | **Du 28 oct. au 03 nov. 2026** | **Du 21 au 27 oct. 2026**



Légende : absence de charançons ; 1 charançon ; 2 à 5 charançons ; supérieure à 5 charançons

Modélisation des vols

Le modèle indique une baisse de la probabilité de piégeages pour les jours à venir.

Analyse de risque

Le risque est désormais très faible à l'échelle du réseau. Quelques captures récentes restent toutefois signalées dans un secteur localisé à l'est de l'axe Pacy-sur-Eure–Nonancourt (27).

La dynamique de vol devrait désormais fortement ralentir, voire s'arrêter.

Résistance : le couple « CBT / pyréthrinoïdes » présente un risque de résistance.

Prochain BSV le 19 novembre 2026

Notes Nationales Biodiversité → cliquer sur les vignettes



Produits de Biocontrôle : infos

Résistances aux pesticides : infos

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :
AGRIAL, AGRICOACH, COOP CREULLY, CRA NORMANDIE, D2N, SOUFFLET AGRICULTURE