



le Bulletin de Santé du Végétal

Normandie



Animatrice référente
Marie-Laure BLANC
FREDON Normandie
02 31 46 96 53 - 06 89 81 75 08
marie-laure.blanc@fredon-normandie.fr



Animatrice suppléante
Marielle SUIRE
Chambres d'agriculture de Normandie
02 35 59 47 50
marielle.suire@normandie.chambagri.fr

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites de la DRAAF, des Chambres d'agriculture et des partenaires du programme. **À consulter sur :**

- normandie.chambres-agriculture.fr



BSV n°23 le 03 septembre 2026 (Semaine 36)

Contexte météo

Pour cette fin de semaine, les températures restent de saison avec un temps sec et des éclaircies.

L'essentiel de la semaine

BETTERAVE ROUGE : présence de chenilles défoliatrices dans le Calvados à surveiller.

CAROTTE/CELERI : reprise du vol de mouche de la carotte hormis en vallée de Seine.

CHOU/NAVET : vol de mouche du chou sur navet au Mont Saint Michel.

POIREAU : évolution du thrips à surveiller

SALADE : évolution des pucerons et noctuelles à surveiller

Sommaire

BETTERAVE ROUGE :	2
CAROTTE - CELERI :	3
CHOU - NAVET :	7
OIGNON :	11
POIREAU :	12
SALADE :	15
PULLULATION Punaises du colza :	19
LES NOTES NATIONALES BIODIVERSITE :	20

BETTERAVE ROUGE :

Suivi :

Département	Bassin	Parcelles suivies	Stade
50	Mt St Michel	1 parcelle	En cours de grossissement à récolte
76		1 parcelle	
14		1 parcelle	

Charançon *Lixus juncii*

Observations :

Pas de nouveau signalement dans les parcelles du réseau cette semaine.

Nuisibilité :

Ce sont les larves qui sont responsables des dégâts observés sur les cultures de betteraves.

Pour en savoir plus :

<https://www.itbfr.org/publications/fiches-bioagresseurs/le-charancon-lixus-juncii>

Ce charançon s'attaque également aux blettes où les piqûres de ponte sont plus faciles à voir.

Evolution du risque :

Il n'y a pas de risque de ré-infestation car cet insecte ne présente qu'une seule génération par an.

- En l'absence d'observations d'adultes et en l'absence de larves, il n'y a plus de risque.
- Pour les parcelles atteintes, suite à la présence des larves, celles-ci vont se nymphoser pour donner des adultes. Ces individus sont incapables de s'accoupler car l'appareil reproducteur des femelles n'est pas développé. Ils quittent alors les parcelles de betteraves à la recherche d'un lieu pour passer l'hiver.

Noctuelles défoliatrices

Observations :

La présence de noctuelles, surement noctuelle de la betterave, est constatée dans une parcelle du Calvados sur 30% des plantes.

Evolution du risque :

A ce jour, la pression est faible. A surveiller en cas de présence de plusieurs chenilles par plant pouvant conduire à des pertes.



Jeune chenille et chenille plus âgée sur betterave (CA14)

Cercosporiose

Observations :

Pas d'évolution dans les parcelles du réseau.

Nuisibilité :

La propagation de la maladie peut être rapide et passer de quelques feuilles tachées à un feuillage en grande partie brûlé. La nécrose des feuilles engendre la diminution de la photosynthèse et peut impacter la quantité et la qualité des récoltes.

Evolution du risque :

Les averses peuvent favoriser son développement. Le risque est moyen. L'irrigation reste un facteur favorisant.

Oïdium

Observations :

Un foyer d'oïdium est présent dans une parcelle du Calvados sur 5% des plantes.

Evolution du risque :

Un temps chaud (autour de 20 °C à 25 °C) combiné à une alternance de périodes sèches et humides (ou de fortes rosées) est favorable à son développement. Le risque est présent.



Feutrage blanc (CA14)



CAROTTE - CELERI :





Suivi :

Département	Bassin	Carotte	Céleri rave	Céleri branche	Stade
76		/	2	/	Céleri rave : grossissement Céleri branche : croissance foliaire Carotte : grossissement
14		2	3	/	
50	Val de Saire	4	/	3	
	Surtainville	2	1	/	
	Créances	5	/	/	
	Mt St Michel	5	3	/	

Mouche de la carotte

Piégeage :





Nuisibilité :

Ce sont les larves qui sont responsables des dégâts observés sur les cultures d'Apiacées.

Pour en savoir plus : <https://www.ctifl.fr/ravageur-connaissance-et-maitrise-de-la-mouche-de-la-carotte-point-sur-les-maladies-et-ravageurs-le-3>

Evolution du risque :

Hormis en vallée de Seine, une reprise des captures, plus ou moins importantes est observée. Le risque est présent sur ces secteurs. Evolution à suivre avec les prochains relevés.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ La pose et le maintien d'un voile anti-insectes est recommandé pendant la durée du vol sur les cultures sensibles d'Apiacées.
- ➡ Les rotations sont indispensables pour éviter que les mouches issues des pupes hivernantes émergent sous les bâches. L'éloignement de parcelles implantées en carotte l'année précédente est également recommandé.

Mouche du céleri

Piégeage :

Nb mouche/piège/semaine	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29	Sem 30	Sem 31	Sem 32	Sem 33	Sem 34	Sem 35	Sem 36
Vallée de Seine	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0
Calvados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Val de Saire	0,5	0,3	0,5	0,08	0	0	0	0	0,08	0,08	0	0
Surtainville	0	0,75	0,5	0,25	0,11	0	0	0	0	0	0	0
Mont Saint Michel	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aucune capture dans les parcelles du réseau.

Observations :

Aucune galerie récente n'a été notée dans les parcelles de céleris branche.

Nuisibilité :

Ce sont les asticots de la mouche du céleri qui creusent des galeries sur le feuillage. Une forte attaque peut être préjudiciable sur jeunes plants. Sur céleri branche, la présence de ces mines peut nuire à la qualité commerciale du produit.

Seuil indicatif de risque :

Sur céleri-branche : pendant tout le cycle car dépréciation du feuillage.

Evolution du risque :

Evolution à suivre en fonction des piégeages. Au vu des stades des céleris rave, il n'y a plus de risque. Sur céleri branche, il convient d'observer régulièrement vos parcelles pour détecter l'apparition de nouvelles galeries. Le risque est faible au vu de l'absence de capture.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ la pose et le maintien d'un voile anti-insecte sont recommandés pendant la durée du vol sur les jeunes plants.

Alternaria

Observations :

Comme les semaines précédentes, des symptômes d'*Alternaria* sont observés dans quatre parcelles de carotte situées dans la Manche mais à un niveau faible.

Evolution du risque :

Les températures estivales combinées à de l'irrigation restent très favorables au développement de cette maladie. Le risque est **présent en cas d'irrigation, d'averses** ou de végétation importante. Evolution à suivre.

Septoriose

Observations :

La présence de cette maladie est stable dans les parcelles du réseau.



Septoriose

Evolution du risque :

L'eau étant indispensable à la germination des spores, l'irrigation, les averses et les fortes rosées sur les céleris sont favorables aux contaminations de cette maladie. Le risque est **présent en cas d'irrigation et/ou d'averses**.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- ➡ Favoriser la rotation des cultures (> 2 ans) avec des plantes non-hôtes.
- ➡ Éliminer et enfouir profondément dans le sol les débris végétaux pour accélérer leur décomposition.
- ➡ Le travail au champ doit se faire lorsque le feuillage est sec.
- ➡ Eviter les irrigations qui favorisent une longue durée d'humectation du feuillage (par exemple, ne pas arroser en soirée ou début de nuit).

CHOU - NAVET :


Suivi :

Département	Bassin	Chou	Navet	Stade
76		2		Chou : 12 feuilles à pommaison
14	Nord de Caen	3		
	Mont Saint Michel	/	1	Navet : levée à +9 feuilles étalées
50	Val de Saire	5	3	
	Surtainville	1	1	

Aleurode

Observations :

La présence des aleurodes est plutôt stable dans deux parcelles du Calvados et une en vallée de Seine sur 20 à 100% des choux de Milan, avec des effectifs également stables.



Aleurode du chou

Evolution du risque :

Ces mouches blanches se retrouvent préférentiellement sur les choux de Milan et de Bruxelles. Avec le temps sec annoncé, le risque d'augmentation des populations reste **présent**. Observez attentivement vos parcelles.

Gestion du risque :



Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle> Contactez votre technicien.

Altise

Observations :

Comme la semaine dernière, leur présence est observée en vallée de Seine sur 20 à 45% des choux avec des effectifs de 1 à 5 individus par chou.



Nuisibilité :

Leur nuisibilité est liée aux morsures circulaires de 1 à 2 mm perforantes ou non sur les feuilles. En cas de population importante et de températures élevées, les altises peuvent détruire les plus jeunes plants. Le stade sensible va de la plantation au stade 10 feuilles.

Evolution du risque :

A ce jour, les effectifs restent faibles, évolution à suivre avec le temps sec annoncé la semaine prochaine. Une surveillance régulière de vos parcelles de jeunes plants est conseillée. Elle vous permettra de suivre l'évolution des populations.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- ➡ Un travail du sol superficiel et régulier perturbe le développement des altises.
- ➡ Eliminer toutes les adventices, en particulier celles de la famille des crucifères. En effet, elles permettent aux altises de s'abriter et de se maintenir.

- ➡ Favoriser un développement rapide des jeunes plants.
- ➡ La pose d'un voile/filet anti-insectes dès le début d'activité de l'altise permet de réduire le niveau d'attaque. Par contre, elle peut présenter un risque, si aucune rotation n'a été pratiquée.

Chenilles défoliatrices

Observations :

La présence de chenilles est plutôt faible dans les parcelles du réseau. Des pontes et/ou des chenilles de piéride du chou et de piéride de la rave ont été observées dans trois parcelles du réseau sur 5 à 50% des choux.



Chenille de noctuelle du chou



Chenilles de piéride du chou



Chenille de piéride de la rave

Élément de biologie :

Savez-vous différencier les chenilles phytophages du chou ?



Evolution du risque :

Les averses orageuses n'ont pas été favorables au vol des papillons. L'activité des papillons et des chenilles est à surveiller avec le retour des conditions sèches.

- Observez attentivement les choux feuilles en début de pomaison ainsi que ceux à inflorescence pour lesquels la présence de chenilles et de déjections peut conduire à des déclassements.
- Les chenilles de noctuelle, de teigne et de piéride de la rave pénètrent dans les pommes et y laissent des déjections. Celles de piéride du chou restent sur les feuilles extérieures.

Gestion du risque :

Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle> Contactez votre technicien.

Mouche du chou

Piégeage :

Des captures sont enregistrées au Mont Saint Michel.

Nb mouche/piège/semaine	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
Val de Saire_navet	0	0	0	0	0	0	0	0
Val de Saire_chou	0	0	0	0	0	0	0	0
Surtainville_navet	0	0	0	0	0	0	0	0
Surtainville_chou	0	0,5	0	0	0	0	0	0
Mont Saint Michel_navet							Mise en place	8

Observations :

Aucun dégât de mouche du chou n'est observé cette semaine.

Evolution du risque :

Une activité est enregistrée sur le secteur du Mont Saint Michel. Le risque est présent. Evolution à suivre en fonction des prochains piégeages.

- Il faut être prudent et laisser la culture sous voile durant tout le cycle des crucifères racines.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- La pose d'un voile/filet anti-insectes sur les jeunes plantations dès le début d'activité de la mouche du chou permet de réduire significativement le niveau d'attaque.

Pucerons verts et cendrés

Observations :

Comme la semaine dernière, la présence des pucerons cendrés est observée dans sept parcelles sur 4 à 16% des choux.

Ces foyers restent dans la majorité des cas localisés sur les feuilles de la couronne. Des pucerons parasités sont observés dans certains foyers.

Evolution du risque :

En dehors des averses, les conditions météo restent favorables à l'activité des pucerons. Surveillez les séries en début ou en cours de pomaison. Préservez les auxiliaires lorsqu'ils sont présents.



Foyer avec marbrure caractéristique du feuillage et pucerons parasités.

Thrips

Observations :

La présence de thrips est stable. Ils sont observés dans trois parcelles de choux cabus du nord Cotentin sur 20 à 32% des plantes.

Nuisibilité :

Les piqûres de nutrition des thrips provoquent l'apparition de nombreux petits cals, souvent réunis en larges plages, qui finissent par brunir rendant le produit impropre à la commercialisation en circuit long. C'est à la formation de la pomme, quand les feuilles commencent à se resserrer que l'insecte s'installe.

Evolution du risque :

En l'absence d'averses, les conditions météo sont de nouveau **favorables** à leur développement. Observez attentivement les séries en tout début de pommaison. Une surveillance régulière de vos parcelles est conseillée. Elle vous permettra de suivre l'évolution des populations.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ Afin de limiter les dégâts il est conseillé d'utiliser des cultivars de chou tolérants aux attaques des thrips ou de récolter les choux avant qu'ils soient en sur-maturité.

Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole> . Contactez votre technicien.

Punaise ornée

Observations :

Pas de nouveau signalement.

Nuisibilité :

Les piqûres de ces punaises peuvent être préjudiciables en conditions chaudes et sèches notamment sur les jeunes plants. <http://ephytia.inra.fr/fr/C/26202/VigiJardin-Symptomes-degats>

Évolution du risque :

Les fortes chaleurs enregistrées cet été sont très favorables à leur pullulation.



Larves de punaises (Réseau Bio en Normandie)

Pigeon

Observations :

Absence d'attaques récentes de pigeons dans les parcelles du réseau.

Evolution du risque :

Dès que les parcelles sont débâchées, le risque est important. Surveillez vos jeunes plantations.

Maladies sur feuillage

Observations :

Des symptômes de bactériose à *Xanthomonas* sont toujours observés dans trois parcelles du nord Cotentin sur 12 à 28% des choux. Cette présence est en augmentation dans une parcelle. Des taches récentes d'*Alternaria* ont été observées dans une parcelle de choux cabus du Calvados sur 12% des plantes.

Evolution du risque :

A ce jour, la présence de maladies est faible. Le retour d'un temps sec devrait permettre de limiter leur développement. Il faut rester vigilant en cas de brume et/ou d'irrigation.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- ➡ Réaliser de longues rotations culturales : elles ne devront pas faire intervenir d'autres crucifères également sensibles.
- ➡ Assurer un bon drainage aux parcelles cultivées.
- ➡ Eviter les trop fortes densités de plantation afin de favoriser l'aération du feuillage.
- ➡ La proximité de crucifères touchées favorise les contaminations, surveiller les éventuels premiers foyers (dans les zones à plus forte humidité : autour des sprinklers par exemple).
- ➡ Préférer l'irrigation au goutte à goutte à l'aspersion. A défaut, réaliser les arrosages par aspersion le matin afin que la végétation ressuie rapidement en cours de journée.
- ➡ Eviter les irrigations quotidiennes (hors début de cycle et sols particuliers)
- ➡ Ne pas travailler dans la culture tant que la végétation est mouillée.
- ➡ Eliminer assez rapidement les débris végétaux, en cours de culture à la suite des différentes opérations culturales, et en fin de culture après l'arrachage des plantes. Ils devront être détruits ou enfouis profondément.

OIGNON :

Suivi :

Département	Bassin	Parcelles suivies	Stade
14		6 parcelles	Fin bulbaison à récolte

Mildiou

Observations :

Pas d'évolution, aucune tache n'a été observée dans les parcelles du réseau.

Evolution du risque :

Au vu des stades observés en parcelle, il n'y a plus de risque.

Thrips

Observations :

Aucun thrips n'a été observé dans les parcelles du réseau.

Nuisibilité :

Sur oignon, les thrips sont souvent peu préjudiciables sauf en cas de populations importantes en conditions très favorables (temps chaud et sec). Pour l'oignon blanc botte, le feuillage peut être déprécié en cas de forte population.

Evolution du risque :

Au vu des stades, il n'y a plus de risque d'impact vis-à-vis de ce ravageur.

Maladie des taches brunes

Observations :

Cette maladie reste présente dans deux parcelles du Calvados.

Evolution du risque :

La maladie des taches brunes intervient la plupart du temps de façon secondaire, au niveau des blessures des feuilles (vent, grêle), et sur feuilles âgées (plus sensibles à la maladie).

Les averses et les irrigations ont pu créer des conditions favorables.

POIREAU :

Suivi :

Département	Bassin	Parcelles suivies	Stade
50	Val de Saire	6 parcelles	Grossissement à proche récolte
	Surtainville	2 parcelles	
	Créances	6 parcelles	
	La Haye Pesnel	1 parcelle AB	
	Lingreville	1 piégeage teigne en AB	
	Mont Saint Michel	5 parcelles	
14	Nord de Caen	1 parcelle	
76 - 27		2 parcelles	


Thrips

Observations :

Comme les semaines précédentes, des thrips sont présents dans l'ensemble des parcelles du réseau (sauf une en vallée de Seine) sur 20 à 100% des plantes. Les effectifs vont de 2 à +4 individus par plante.

Des *Aeolothrips* sp., thrips prédateurs de thrips, ainsi que des punaises prédatrices sont présents dans certaines parcelles dans les secteurs de la vallée de Seine, de Créances et du Mont Saint Michel.

Piégeage :



Selon les secteurs, les captures de thrips sont hétérogènes.

Evolution du risque :

La pression reste **importante** dans les parcelles du réseau car les populations sont installées dans les poireaux.

Les conditions sèches annoncées seront favorables à leur activité.

- Surveillez très régulièrement vos parcelles, notamment celles de poireaux de fin d'été et d'automne pour lesquelles le risque d'augmentation des populations reste **fort**.
- Sur poireaux d'hiver, le risque est plus faible, le feuillage aura plus de temps pour se renouveler.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ FICHE GECO : Gestion des thrips sur poireau RÈGLE DE DÉCISION [https://geco.ecophytopic.fr/geco/Concept/Gestion Des Thrips Sur Poireau - Fiche 1](https://geco.ecophytopic.fr/geco/Concept/Gestion%20Des%20Thrips%20Sur%20Poireau%20-%20Fiche%201)
- ➡ Les bassinages ou les arrosages fréquents par aspersion contrarient l'installation et le développement des thrips. Attention, un bassinage non maîtrisé peut induire le développement de champignon pathogène : la végétation et le sol doivent être secs le soir.

Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle> . Contactez votre technicien.

Teigne

Observations :

Aucune chenille n'a été observée dans les parcelles du réseau.

Piégeage :

Nb papillon/piège/semaine	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
Lingreville	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances	0	/	0	0	0	0	0	/
Val de Saire	0	0	0	0	0	0	0	0
Surtainville	/	0	/	0	0	0	0	0
La Haye Pesnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Vallée de Seine		0	0	/	/	/	0	0

Evolution du risque :

Le risque débute dès la présence de chenilles. Observez attentivement vos parcelles notamment en AB dans le Calvados.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- ➡ Pose d'un filet pendant la période de vol.



Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle> . Contactez votre technicien.

Rouille

Observations :

Comme les semaines précédentes, aucun symptôme de rouille n'a été constaté dans les parcelles du réseau.

Evolution du risque :

Les averses combinées à de la brume/bruine peuvent créer des conditions favorables. A ce jour, le risque reste faible. Le risque dépend de la sensibilité variétale et du créneau de production.

Gestion du risque :



Prophylaxie :

- ➡ Privilégiez les variétés peu sensibles.
- ➡ En cas d'irrigation, intervenir le matin pour favoriser un séchage rapide du feuillage.

Maladie des taches pourpres, *Alternaria/Stemphylium*

Observations :

Cette maladie est constatée dans deux parcelles du nord Cotentin sur 4 à 12% des poireaux.

Evolution du risque :

Les irrigations accompagnées de températures estivales sont très favorables à son développement. Evolution à suivre notamment dans les parcelles proches de la récolte. En l'absence d'irrigation ou d'averses, le risque est quasi nul.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ En cas d'irrigation, intervenir le matin pour favoriser un séchage rapide du feuillage.
- ➡ Ajuster la fertilisation azotée (sensibilité de la plante augmentée en cas d'excès)

SALADE :

Suivi :

Département	Bassin	Parcelles suivies	Stade
76 - 27		2 parcelles	
14		4 parcelles	
50	Val de Saire	4 parcelles	De jeunes plants à récolte.
	Surtainville	2 parcelles	
	Créances	2 parcelles	
	Mont Saint Michel	5 parcelles + 2 frisées	
	La Haye Pesnel	1 parcelle en AB	
	Lingreville	1 piégeage noctuelle gamma en AB	

Limace

Observations :

Leur présence n'est pas signalée dans les parcelles du réseau.

Evolution du risque :

A surveiller en cas d'averses ou d'irrigation.

Note nationale BSV :

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Limaces_Note_nationale_BSV_141010_cle84efec_0.pdf

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ Les leviers agroécologiques sont les premières méthodes de lutte à mettre en œuvre. Ces mesures préventives visent à rompre le cycle de vie des limaces ou à limiter leur développement.
- ➡ les rotations : gestion de ce ravageur à l'échelle du système de culture. Par exemple un précédent poireau est préférable à un précédent blé pour une culture de salade précoce.
- ➡ le travail du sol : même superficiel, il peut induire une forte mortalité sur les stades jeunes, la destruction de leur habitat. Il perturbe leur alimentation et leurs déplacements.

- ➡ la gestion des résidus de cultures permet la destruction des larves présentes ainsi que les abris.
- ➡ la gestion de la période d'interculture.

Biocontrôle :

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>. Contactez votre technicien.

Puceron

Observations :

De petites colonies de *Nasonovia ribis-nigri* ont été notées :

- dans deux parcelles au nord de Caen sur 4 à 28% des laitues.
- dans cinq parcelles du nord Cotentin sur 4 à 20% des laitues.

Seuil indicatif de risque :

Pour les productions de frais : 20% de salades occupées par au moins un puceron aptère en été.



Colonie au cœur d'une laitue

Résistance :

Des résistances sont répertoriées vis-à-vis de *Nasonovia ribisnigri*.

Plus de détails : <https://www.r4p-inra.fr/fr/statut-des-resistances-en-france/>

Evolution du risque :

A ce jour, la pression est globalement faible et stable. Les conditions annoncées seront favorables à leur développement. Observez régulièrement vos parcelles afin de repérer les débuts de colonies et l'installation de la faune auxiliaire.

Noctuelles défoliatrices

Piégeage noctuelle gamma :

Nb moyen de papillon/piège/semaine	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26
Surtainville	3	4	5	5	2	5	6	6
Val de Saire	8	0	9	6,3	7	2	16	7
Créances	0	/	10	8	7	6	10	1
Mont Saint Michel	34	18	52	17	66	30	19,5	10
Calvados	9	44	31	37,5	47,5	21	26	33
Lingreville	34	5	7	7	2	18	67	66

Piégeage noctuelle de la tomate *Heliothis armigera* :

- 4 papillons capturés cette semaine dans le Calvados contre 31 la semaine dernière,
- 9 papillons piégés cette semaine en vallée de Seine contre 4 la semaine dernière
- 4 papillons piégés à Surtainville
- 2 papillons dans le val de Saire et au Mont Saint Michel

Observation :

La présence de chenille de noctuelle gamma est notée en vallée de Seine sur 20 à 25% des laitues et sur le secteur de Créances sur 4 à 8% des plantes observées.



Adulte de *A. gamma*

adulte de noctuelle *H. armigera* et toute jeune chenille

Evolution du risque :

Observez attentivement vos parcelles afin de repérer les jeunes chenilles. Les conditions météo annoncées restent **favorables** à l'activité des papillons et au développement des chenilles.

Gestion du risque :



Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>. Contactez votre technicien.

Thrips

Observations :

Les populations de thrips sont en recul dans les parcelles de salades du Mont St Michel. Leur présence est constatée dans 3 parcelles de laitues sur 8 à 15% des plantes. Cette présence est également notée au nord de Caen dans une parcelle sur 12% des laitues.

Les piqures et les populations de thrips n'ont pas progressé et restent situées sur les feuilles les plus âgées.

Evolution du risque :

Les averses orageuses ont pu limiter les populations. Observez régulièrement vos parcelles notamment vos séries en début de pommaison. Ces observations vous permettront de suivre l'évolution des populations. **Le risque reste présent** au vu des conditions sèches annoncées pour la semaine prochaine.

Pigeon

Observations :

Il n'est pas observé de nouveaux dégâts.

Evolution du risque :

Dès que les parcelles sont débâchées, le risque est important. Surveillez vos plantations.

Mildiou

Observations :

Cette maladie n'est pas présente en parcelle cette semaine.

Evolution du risque :

Surveillez vos parcelles notamment les variétés sensibles et les stades proches de la récolte en cas de brume, d'averses et d'irrigation. **Le risque reste faible.**

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ Arrosez le matin afin que le feuillage sèche rapidement, jamais le soir,
- ➡ Attention à la densité de plantation,
- ➡ Désherbez régulièrement les rangs pour favoriser l'aération.
- ➡ Eliminer les déchets de culture : broyer les déchets de culture immédiatement après récolte,
- ➡ réaliser un désherbage soigné.
- ➡ Choisir des variétés résistantes : c'est le moyen de lutte à privilégier. Dans la mesure du possible sélectionner des variétés présentant une résistance toutes races. Si une variété sensible doit être cultivée, la placer à part et limiter les surfaces d'un seul tenant. De nouvelles races apparaissent cependant : rester vigilant.

Pourritures basales : Sclérotinia

Observations :

La présence de sclérotinia est observée sur des stades 'récolte' en AB dans le sud Manche sur 32% des laitues.

Nuisibilité :

<http://ephytia.inra.fr/fr/C/5413/Salades-Sclerotiniose-Sclerotinia-sclerotiorum-Sclerotinia-minor>

Evolution du risque :

Les stades proches de la récolte sont les plus sensibles. Le risque est inféodé à la parcelle pour le sclérotinia. A surveiller en cas d'averses ou d'irrigation.

Gestion du risque :

Prophylaxie :

- ➡ Arrosez le matin afin que le feuillage sèche rapidement, jamais le soir,
- ➡ Attention à la densité de plantation,
- ➡ Désherbez régulièrement les rangs pour favoriser l'aération.

PULLULATION Punaises du colza

Suite à l'information parue dans le [BSV 22 de la semaine dernière](#), aucun retour de pullulation n'a été signalé dans le réseau Légumes Normandie.

Dans notre région, des cas très ponctuels sont signalés par le réseau colza cette semaine : deux cas de parcelles de colza attaquées par des punaises sont signalées ce début de semaine dans le secteur d'Arromanches / Longues s/Mer (14).



Plantule de colza desséchée suite aux piqûres des larves de *Nysius* (Source Terres Inovia)




Illustration de différents stades de l'espèce *Nysius cymoides* - a) Larve stade III (1,0 mm) ; b) Larve stade IV (1,5 mm) ; c) Larve stade V (2,2 mm) ; d) Adulte mâle (2,5 mm). La taille correspond à la mesure entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de l'abdomen

(photos : laboratoire d'Eco-Entomologie – J.-D. Chapelin-Viscardi). (Source Terres Inovia)

En revanche, de nombreux cas, beaucoup plus fréquents et dommageables, sont rapportés cette année dans d'autres régions de France (Centre, Bretagne, Poitou-Charentes, Bourgogne).

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse. (extrait BSV Colza du BSV n°14-26 le 02 septembre 2026 (Semaine 36))

- Plus d'infos [en cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia
- Signaler les attaques sur **colza** via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#).
- Pour les **légumes** : m'envoyer un mail avec photo marie-laure.blanc@fredon-normandie.fr

LES NOTES NATIONALES BIODIVERSITE :



Produits de Biocontrôle : [infos](#)



Résistances aux pesticides : [infos](#)

Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation. Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec
AGRIAL, Bio en Normandie, Biopousses, Chambres d'agriculture Normandie, DRAAF Normandie, LUNOR
FREDON Normandie, SILEBAN et les producteurs