


Pois de printemps

Stades

Les pois de printemps sont en cours de levée. Les pluies et le temps plus doux qui se sont installés depuis 15 jours favorisent des levées homogènes et dynamiques.



Levée



Une feuille




Deux feuilles

Thrips du lin et des céréales (*Thrips angusticeps*)

Observations

La présence de thrips est observée sur une parcelle de pois de printemps, à la note de 0,3 thrips par plante. Des pressions parfois importantes sont signalées en dehors du réseau, sur des parcelles en cours de levée.



Période de risque

Pois de printemps : la période de risque pour le thrips s'étend de la levée au stade 3 feuilles. Il n'y a plus de risque au-delà de ce stade.


Il n'a jamais été observé de dégât de thrips sur **féverole de printemps**.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec :

DRAAF Normandie, Chambre d'Agriculture Régionale de Normandie, APPRO VERT, CA27, CA61, CA76, FREDON Normandie

Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est atteint lorsque l'on dénombre **en moyenne 1 thrips par plante** sur un comptage de 10 plantes par parcelle.



Toutefois le thrips, même en grand nombre, n'engendre des dégâts importants que si les pois ont **une levée lente** liée notamment à de mauvaises conditions climatiques.

Analyse de risque

Le risque est moyen

Les parcelles de **pois de printemps** sont dans la période de risque, et malgré les pluies, les insectes peuvent être présents dans certains secteurs. Le développement rapide des cultures devrait permettre de limiter leur impact.

Les thrips sont à surveiller.

Leviers agronomiques et alternatifs

Soigner la qualité d'implantation : un pois semé dans de bonnes conditions se développe plus rapidement, et est plus à même de résister aux attaques des ravageurs.

Pour aller plus loin

Plus d'informations sur ce ravageur en annexe du [BSV 1](#).

<https://www.terresinovia.fr/-/ravageurs-du-pois-de-printemps-le-thrips>

<https://www.terresinovia.fr/-/thrips-sitones-et-pucerons-le-trio-de-ravageurs-a-surveiller-sur-legumineuses-de-printemps>

Sitone du pois (*Sitona lineatus*)

Observations

Le sitone n'est pour le moment pas observé au sein du réseau, ni signalé en dehors de ce dernier.



Période de risque

La période de risque pour le sitone s'étend **de la levée au stade 5-6 feuilles** pour le pois de printemps.

Seuil indicatif de risque

Sur pois de printemps, le seuil indicatif de risque est atteint lorsqu'on dénombre **5 à 10 encoches** par plante sur les premières feuilles.

Analyse de risque

Le risque est faible à moyen

Les parcelles de **pois de printemps** entrent dans la période de risque.

Les sitones sont à surveiller dès la levée des pois.

Leviers agronomiques et alternatifs

Soigner la qualité d'implantation : un pois semé dans de bonnes conditions se développe plus rapidement, et est plus à même de résister aux attaques des ravageurs.

Pour aller plus loin

Plus d'informations sur ce ravageur en annexe du [BSV 1](#).

<https://www.terresinovia.fr/-/ravageurs-du-pois-le-sitone>

<https://www.terresinovia.fr/-/thrips-sitones-et-pucerons-le-trio-de-ravageurs-a-surveiller-sur-legumineuses-de-printemps>


Autres ravageurs

Des dégâts d'oiseaux sont signalés sur certaines parcelles de pois de printemps.

Féveroles de printemps

Stades

Les féveroles de printemps sont levées. Les pluies et le temps plus doux de ces quinze derniers jours favorisent des levées homogènes et dynamiques.



Stades levée à deux feuilles



Sitone du pois (*Sitona lineatus*)

Observations

Le sitone n'est pour le moment pas observé au sein du réseau, ni signalé en dehors de ce dernier.

Période de risque

La période de risque pour le sitone s'étend **de la levée au stade 5-6 feuilles** pour la féverole de printemps.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec :

DRAAF Normandie, Chambre d'Agriculture Régionale de Normandie, APPRO VERT, CA27, CA61, CA76, FREDON Normandie

Seuil indicatif de risque

Sur **féverole de printemps**, le seuil de risque est atteint lorsque toutes les feuilles portent des encoches.

Analyse de risque

Le risque est faible à moyen

Les parcelles de **féveroles de printemps** entrent dans la période de risque.

Les sitones seront à surveiller dès la levée des féveroles.

Leviers agronomiques et alternatifs

Soigner la qualité d'implantation : une féverole semée dans de bonnes conditions se développe plus rapidement, et est plus à même de résister aux attaques des ravageurs.

Pour aller plus loin

Plus d'informations sur ce ravageur en annexe du [BSV 1](#).

<https://www.terresinovia.fr/-/sitone-tres-friand-de-feverole>

<https://www.terresinovia.fr/-/thrips-sitones-et-pucerons-le-trio-de-ravageurs-a-surveiller-sur-legumineuses-de-printemps>

Prochain BSV le 29 mars